1150005305

IMECC

T/UNICAMP Si38e

ESTRUTURAS ALGÉBRICAS E SÉRIES FORMAIS

LUIZ VASCONCELOS DA SILVA

Este exemplar corresponde a redação final da tese defendida pelo Sr. Luiz Vasconcelos da Silva e aprovada pela Comissão Julgadora.

T. M. Viswanathan

Orientador:

Prof. Dr. TENKASI M. VISWANATHAN

Dissertação apresentada no Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação da Universidade Estadual de Campinas, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Matemática.

DEZEMBRO/1983

T.M.
Si38i
IM/T483

IMECC
BIBLIOTECA

Ao meu pai Josué;

À memória da minha mãe Clonice;

À minha esposa Luciene e

Ao meu filho Luiz.

**BIBLIOTECA
IMECC**

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Tenkasi M. Viswanathan pelos comentários que apresentou enriquecendo este trabalho;

Ao Prof. Dr. Antônio J. Engler pelo seu acompanhamento, ajudando-me a compreender vários pontos desta dissertação e pelas discussões que nos levaram ao segundo caminho para a estrutura do fecho algébrico de $k((T))$, mostrado no Capítulo IV;

Ao Prof. Dr. Nelo da Silva Allan pela sua importante colaboração nos meus estudos visando o Exame de Qualificação, quando orientou os seminários das diversas disciplinas que dele fizeram parte;

À minha esposa Luciene;

À Célia pelo bom trabalho de datilografia

e à CAPES pelo apoio financeiro.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	1
CAPÍTULO I - PRELIMINARES SOBRE CORPOS VALORIZADOS.....	6
1. Valorizações Discretas de Posto 1.....	6
2. Completamentos e Extensões de Valorizações.....	12
3. Completamento de Anel Local.....	25
CAPÍTULO II - CORPOS COMPLETOS E O TEOREMA DE REPRESENTAÇÃO	26
CAPÍTULO III - ESTRUTURA DE CORPOS COMPLETOS A RESPEITO DE VALORIZAÇÕES DISCRETAS.....	45
CAPÍTULO IV - O FECHO ALGÉBRICO DO CORPO DE SÉRIES FORMAIS $K((T))$	53
CAPÍTULO V - MÓDULOS FINITAMENTE GERADOS SOBRE O ANEL DE POLINÔMIOS $k[X]$	67
CAPÍTULO VI - MÓDULOS FINITAMENTE GERADOS SOBRE O ANEL DE SÉRIES FORMAIS $\mathbb{Z}_p[[X]]$	92
1. Teorema de Preparação de Weierstrass.....	94
2. Estrutura de Módulos Finitamente Gerados sobre $\mathbb{Z}_p[[X]]$..	104
BIBLIOGRAFIA.....	148

INTRODUÇÃO

Este trabalho é um estudo sobre estruturas algébricas relacionadas com séries formais. Seu ponto crucial está no Capítulo VI, onde tratamos da estrutura de módulos finitamente gerados sobre o anel de séries formais $\mathbb{Z}_p[[X]]$ onde $\mathbb{Z}_p$ é o anel dos inteiros p -ádicos.

Esta tese também trata dos seguintes resultados: 1) No Capítulo III descrevemos a estrutura de um corpo valorizado completo a respeito de uma valorização discreta e tendo característica igual à característica do corpo de restos. A estrutura é a de um corpo de séries formais $\bar{k}((T))$; 2) No Capítulo IV descrevemos o fecho algébrico de um corpo de séries formais $k((T))$, onde k é algebricamente fechado e de característica 0. Toda extensão finita é também um corpo de séries formais! Para todo inteiro $n \geq 1$, existe apenas uma extensão de grau n . O grupo absoluto de Galois em questão é procíclico, sendo isomorfo a $\hat{\mathbb{Z}}$.

O resultado do Capítulo VI é o seguinte: Seja M um módulo finitamente gerado sobre o anel $A = \mathbb{Z}_p[[X]]$; onde p é um inteiro primo e $\mathbb{Z}_p$ é o anel dos inteiros p -ádicos. Diz-se que $f \in A$ é um polinômio distinguido se f é da forma $f = X + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0 \in A[X]$ onde p divide a_i , $\forall i = 0, 1, \dots, n-1$. Existem inteiros $r, s, t \geq 0$, $k_1, \dots, k_s \geq 1$, polinômios distinguidos $f_1, f_2, \dots, f_r$ e um homomorfismo $\theta : M \rightarrow M'$ onde

$$M' = \Lambda^t \oplus \frac{\Lambda}{(f_1)} \oplus \dots \oplus \frac{\Lambda}{(f_r)} \oplus \frac{\Lambda}{(p^1)} \oplus \frac{\Lambda}{(p^2)} \oplus \dots \oplus \frac{\Lambda}{(p^s)}$$

tais que $\ker \theta$ e $\text{coker } \theta$ são finitos. Assim o teorema de estrutura em questão não se trata de um isomorfismo, mas sim de um "pseudo-isomorfismo" ($\ker \theta$ e $\text{coker } \theta$ são finitos).

A importância deste resultado de Iwasawa pode ser vista da seguinte maneira: Vamos supor que de fato M é um grupo de Galois $\text{Gal}(L/k)$. Então $\ker \theta$ é um subgrupo finito de M e temos o seguinte quadro:

$$\begin{array}{ccc} \text{finito} & \left[\begin{array}{l} L \\ F \end{array} \right. & (1) \\ & & \ker \theta \\ & k & M = \text{Gal}(L/k) \end{array}$$

Se F é o subcorpo fixo por $\ker \theta$, então L/F é uma extensão finita e F/k é uma extensão Galoisiana tendo $\theta(M)$ como grupo de Galois e $\theta(M)$ é um submódulo de índice finito em M' . Do ponto de vista da Teoria de Galois o que interessa é a extensão infinita F/k . Nesta situação então o resultado atende perfeitamente ao objetivo de descrever M .

Iwasawa considerou uma $\mathbb{Z}_p$ -extensão de um corpo de números algébricos k , isto é, uma extensão Galoisiana L/k cujo grupo

de Galois é isomorfo ao grupo aditivo $\mathbb{Z}_p$. Como $\mathbb{Z}_p \supset (p) \supset (p^2) \supset \dots \supset (p^n) \supset \dots$ temos uma cadeia ascendente de corpos $k = k_0 \subset k_1 \subset \dots \subset k_n \dots$ sendo k_n o subcorpo fixo por (p^n) (isto é, pelo subgrupo isomorfo a (p^n)). Seja C_n o p -Sylow subgrupo do grupo das classes de k_n . Temos homomorfismos naturais $C_{n+1} \rightarrow C_n$ e isto define $C = \varprojlim C_n$. Um Teorema de Iwasawa descreve a cardinalidade de C_n e esta conclusão decorre do fato de que C é um $\mathbb{Z}_p[[X]]$ -módulo finitamente gerado.

Não chegamos a demonstrar esses resultados sobre grupos de classes. O Teorema 3 do Capítulo VI trata da estrutura dos Λ -módulos finitamente gerados. A nossa abordagem segue a de Lang [6], que é matricial. O módulo M é descrito por geradores e relações, e os coeficientes dessas relações dão origem a uma matriz $m \times n$ que chamamos matriz de relações. A nossa finalidade é mudar esta matriz sucessivamente via operações admissíveis - por exemplo, permutar linhas ou colunas, multiplicar uma linha por elementos unidades, etc. - para conseguir uma matriz diagonal de relações.

Para esclarecer o papel dessas mudanças de matrizes, proporcionamos no Capítulo V a estrutura de módulos finitamente gerados sobre o anel de polinômios $k[X]$. A prova é matricial e traz de modo claro o significado de efetuar uma operação elementar sobre a matriz para o módulo em questão. O resultado do Capítulo V é bem conhecido, no entanto não encontrei um livro que abordasse o assunto via matrizes. A inclusão desse resultado nesta tese foi

motivada pela orientação que fornece para a demonstração do principal teorema do Capítulo VI.

No Capítulo IV tratamos do fecho algébrico do corpo de séries formais conforme segundo parágrafo. Esse resultado é mostrado de duas maneiras: a primeira, usando teoria de ramificação e, a segunda, mais elementar, usando o fato de que se L/K é uma extensão totalmente ramificada e $\text{car } \bar{K} = 0$ ou $\text{car } \bar{K}$ não divide e (índice de ramificação da extensão L/K) então $L = K(\sqrt[e]{\pi})$ onde π é um elemento primo de K .

O Capítulo III, onde desenvolvemos a estrutura de um corpo completo com respeito a uma valorização discreta, usa o Teorema de Representação do Capítulo II que afirma o seguinte: Seja A um anel de valorização discreta completo cujo corpo de frações é K . Se S é um conjunto de representantes do corpo de restos $\bar{K}$ em A e π é um elemento primo de A , então todo elemento $a \in A$ pode ser escrito de modo único como uma série convergente

$a = \sum_{n=0}^{\infty} s_n \pi^n$ com $s_n \in S$. Analogamente, todo elemento $x \in K$ pode ser escrito como $x = \sum_{n=r}^{\infty} s_n \pi^n$ onde $v(x) = r = \min \{n \in \mathbb{Z}; s_n \neq 0\}$.

Esse teorema dá condições para uma boa compreensão do fecho algébrico do corpo $k((T))$.

As definições e os resultados importantes necessários para o desenvolvimento do exposto acima estão relacionados no Capítulo I.

Cabe mencionar que a demonstração do Teorema 3 do Capítulo VI contém elementos novos e simplifica de maneira substancial a prova desse mesmo resultado em Lang [6] e Washington [15]. O Capítulo II também contém elementos novos, por exemplo, a periodicidade da representação por séries de um elemento do completamento de um corpo com respeito a uma valorização discreta não é invariante por mudança de conjunto de representantes.

CAPÍTULO I

PRELIMINARES SOBRE CORPOS VALORIZADOS

Este capítulo tem a finalidade de reunir os conceitos básicos sobre valorizações e alguns resultados pertinentes sobre elas empregados nos capítulos II, III e IV.

Alguns resultados são apenas citados enquanto outros aparecem com provas devido a interesse neles investidos nesta tese. As referências básicas sobre a matéria são [4], [7] e [16].

1. VALORIZAÇÕES DISCRETAS DE POSTO 1

Sejam K um corpo, G um grupo abeliano totalmente ordenado e ∞ um símbolo tal que para todo $g \in G$, $g + \infty = \infty + g = \infty$ e, além disso, $\infty + \infty = \infty$ e $g < \infty$.

Definimos uma *valorização de K* como sendo uma função $v: K \rightarrow G \cup \{\infty\}$ satisfazendo às seguintes condições:

- (i) $v(x) = \infty \iff x = 0$ em K ;
- (ii) $v(xy) = v(x) + v(y)$ para todos $x, y \in K$;
- (iii) $v(x+y) \geq \min \{v(x), v(y)\}$ para todos $x, y \in K$.

Decorre de (ii) e (iii) que se $v(x) \neq v(y)$ então $v(x+y) = \min \{v(x), v(y)\}$.

EXEMPLO 1: Valorização Trivial: $v(x) = 0$ para todo $x \in K^*$.

UNICAMP
BIBLIOTECA CENTRAL

EXEMPLO 2: Sejam A um anel fatorial, K seu corpo de frações e Λ uma família dos primos não-associados de A . Então qualquer elemento $a \in A$ se escreve de modo único como $a = \varepsilon p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_r^{n_r}$ onde ε é uma unidade de A , $n_i \in \mathbb{N}$ e $p_i \in \Lambda$ para todo $i \in \{1, 2, \dots, r\}$. Assim, para cada primo p de Λ , podemos definir uma aplicação $n_p: A \rightarrow \mathbb{Z}$ que a cada $x \in A$ associa o inteiro $n_p(x)$, expoente de p na decomposição de x em fatores primos. Considere agora a seguinte função: $v_p: K \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ definida por $v_p\left(\frac{a}{b}\right) = n_p(a) - n_p(b)$ se $\frac{a}{b} \neq 0$, e $v_p(0) = \infty$. Então v_p é uma valorização de K que é denominada *valorização p-ádica* de K .

Dada uma valorização de um corpo K definimos $A_v = \{x \in K; v(x) \geq 0\}$ e $M_v = \{x \in K; v(x) > 0\}$. A_v é um subanel de K e M_v é o único ideal maximal de A_v . De fato, se x e $y \in A_v$ então $v(x)$ e $v(y) \geq 0$. Logo $v(xy) = v(x) + v(y) \geq 0$ e daí $xy \in A_v$. Além disso, $v(x+y) \geq \min\{v(x), v(y)\} \geq 0$ o que coloca $x+y$ também em A_v . Sejam agora $x, y \in M_v$. Então $v(x)$ e $v(y) > 0$. Logo $v(x+y) \geq \min\{v(x), v(y)\} > 0$, donde $x+y \in M_v$. Se $x \in M_v$ e $y \in A_v$ então $v(xy) = v(x) + v(y) > 0$ e temos $xy \in M_v$. Segue-se que M_v é um ideal de A_v . Como todos os elementos $x \in A_v$ tais que $x \notin M_v$ são unidades de A_v , temos que M_v é o único ideal maximal de A_v .

Chamamos A_v de *anel de valorização* associada a v , M_v de *ideal de valorização* de v e o corpo quociente $A_v/M_v = \bar{K}$ de *corpo de resíduos* de v .

EXEMPLO 1: Se v é a valorização trivial do corpo dos racionais, então $A_v = \mathbb{Q}$, $M_v = (0)$ e $\bar{Q} = \mathbb{Q}$.

EXEMPLO 2: Seja p um número inteiro primo. Se v é a valorização p -ádica de $\mathbb{Q}$ então $A_v = \{\frac{a}{b}; (a,b) = 1 \text{ e } p \nmid b\}$, $M_v = \{\frac{a}{b}; (a,b) = 1 \text{ e } p|a\}$ e $\bar{Q} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ com o isomorfismo dado por

$$\theta : \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow \bar{Q} = A_v/M_v$$

$$\bar{i} \mapsto i + M_v.$$

Sejam v_1 e v_2 duas valorizações de um corpo K com grupos de valores G_1 e G_2 , respectivamente. Dizemos que v_1 é equivalente a v_2 , $v_1 \sim v_2$, se existir um isomorfismo σ de grupos de G_1 em G_2 preservando a ordem.

Dizemos que $A \subseteq K$ é um anel de valorização de K , se dado $x \in K^*$ tivermos $x \in A$ ou $x^{-1} \in A$. Se v é uma valorização de K , então o anel A_v de valorização associada a v é um anel de valorização de K . Todo anel de valorização de K é de fato dado por uma valorização de K . Com efeito, existe uma correspondência bijetora entre as classes de equivalência de valorizações de um corpo K e os anéis de valorização desse corpo dada por $\bar{v} \mapsto A_v$, $\bar{w} \longleftarrow A$ onde $w : K \rightarrow K^*/U_A \cup \{\infty\}$ é definida por $w(x) = xU_A$ se $x \neq 0$ e $w(0) = \infty$, e a ordem em K^*/U_A é definida da seguinte maneira: $xU_A \leq yU_A$ se $x|y$, isto é, se $y = ax$ para algum $a \in A$, ou $Ax \supseteq Ay$. É de fácil verificação que K^*/U_A com

esta ordem é um grupo ordenado.

Estes e outros fatos relevantes na Teoria de Valorizações podem ser encontrados em [4].

Um grupo abeliano G é de posto 1 se $G \neq (0)$ e G não possui subgrupo convexo diferente de G e (0) . Os grupos abelianos ordenados podem ser caracterizados da seguinte maneira:

PROPOSIÇÃO 1: *Seja G um grupo ordenado diferente de (0) . Então são equivalentes as seguintes condições:*

- (i) G é arquimediano, isto é, se $g, h \in G$ com $g > 0$, então existe $n \in \mathbb{Z}$, $n \geq 1$, tal que $ng \geq h$;
- (ii) G é ordem-isomorfo a um subgrupo de $(\mathbb{R}, +)$;
- (iii) G tem posto 1.

Dizemos que um anel de valorização A é discreto de posto 1 se o seu grupo de valores G é isomorfo (como grupo ordenado) a um subgrupo discreto (como subespaço topológico) de $(\mathbb{R}, +)$.

Só existem dois tipos de subgrupos de $(\mathbb{R}, +)$: os subgrupos discretos são cíclicos e os subgrupos não-discretos são densos como subespaços topológicos de $(\mathbb{R}, +)$. Neste trabalho estaremos interessados apenas em valorizações discretas de posto 1 e a proposição seguinte caracteriza essas valorizações em função dos subgrupos de $(\mathbb{R}, +)$.

PROPOSIÇÃO 2: *Seja G um subgrupo de $(\mathbb{R}, +)$, $G \neq (0)$. Então*

são equivalentes as seguintes condições:

- (i) G é discreto como subespaço topológico de $\mathbb{R}$;
- (ii) G é não denso em $\mathbb{R}$ como subespaço topológico;
- (iii) G tem um menor elemento positivo;
- (iv) G é cíclico. De fato, $G = \rho\mathbb{Z}$ para algum real $\rho > 0$.

DEMONSTRAÇÃO: (i) $\Rightarrow$ (ii) é imediato.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Se não vale (iii), dado qualquer número real $\varepsilon > 0$, existe $g \in G$ tal que $0 < g < \varepsilon$. Se $r \in \mathbb{R}$, então $(r-\varepsilon, r+\varepsilon)$ contém um elemento de G . Com efeito, tome $g \in G$ tal que $0 < g < \varepsilon$. Como G é arquimediano, existe $n \geq 1$ tal que $ng \leq r < (n+1)g$ e $(n+1)g < r+\varepsilon$, logo $r < (n+1)g < r+\varepsilon$ o que contradiz (ii).

(iii) $\Rightarrow$ (iv). Seja g_0 o menor elemento positivo de G . Afirmando que $G = \langle g_0 \rangle$. De fato, seja $g \in G$ tal que $g > 0$. Como G é arquimediano, existe $n \geq 1$ tal que $ng_0 \leq g < (n+1)g_0$. Se $g \neq ng_0$ então $ng_0 < g < (n+1)g_0$ implica $0 < a < g_0$ onde $a = (n+1)g_0 - g \in G$ o que contradiz a escolha de g_0 .

(iv) $\Rightarrow$ (i). Tome um número real ε tal que $0 < \varepsilon < \rho$. Então para todo $g \in G$, $(g-\varepsilon, g+\varepsilon)$ contém apenas $g \in G$ e portanto G é discreto. $\square$

Num domínio de ideais principais A , os ideais primos não-nulos são os ideais da forma πA , onde π é um elemento irredutível. Se A é um anel de valorização discreto então A possui um único

elemento irredutível, a menos de multiplicação por uma unidade ; chamaremos tal elemento de *elemento primo* ou *elemento uniformizante* de A . Mais precisamente:

TEOREMA 1: *Seja A um anel de valorização discreto de posto 1. Então A é um domínio de ideais principais (logo noetheriano), A é um anel fatorial com uma só classe de elementos primos associados.*

DEMONSTRAÇÃO: Seja $p \in A$ tal que $v(p) > 0$ e $v(p)$ é o menor elemento positivo de $v(K^*) = G$. Pela Proposição 2, $G = \mathbb{Z}v(p)$. Logo, se $x \in K^*$, $v(x) = nv(p)$ para algum $n \in \mathbb{Z}$; $v(x) = v(p^n)$ o que significa $v(x.p^{-n}) = 0$, isto é, $xp^{-n} = \varepsilon$ é uma unidade de A . Logo $x = \varepsilon p^n$ com ε unidade de A , $p \in M_A$ e $n \in \mathbb{Z}$. Afirimo que p é um elemento primo de A , isto é, se $a, b \in A$ são tais que $p|ab$ então $p|a$ ou $p|b$. Basta mostrar que Ap é um ideal primo de A , na verdade $Ap = M_A$. De fato, sendo $v(p) > 0$, $p \in M_A$ e daí $Ap \subseteq M_A$. Por outro lado, se $y \in M_A$ então $y = np^m$ com n unidade de A e $m \geq 1$, ou seja, $y \in Ap$ e temos $M_A \subseteq Ap$. Portanto $M_A = Ap$ e Ap é um ideal primo.

Da primeira parte da demonstração tem-se que todo $y \in A$ é escrito como $y = \varepsilon p^m$ com $m \geq 0$ e ε unidade de A ; e da segunda parte, que A é um anel fatorial com único elemento primo p (a menos de multiplicação por unidade). Portanto A é um anel fatorial com uma única classe de elementos primos associados.

Seja agora I um ideal não nulo de A ; $v(I)$ tem um elemen-

to mínimo $v(x_0) \geq 0$. É evidente que $Ax_0 \subseteq I$. Reciprocamente, se $y \in I$ então $v(y) \geq v(x_0)$ e temos $v(yx_0^{-1}) \geq 0$, donde $yx_0^{-1} = a \in A$ e $y = ax_0 \in Ax_0$. Logo $I = Ax_0$ e A é um domínio principal. $\square$

2. COMPLEMENTOS E EXTENSÕES DE VALORIZAÇÕES

Seja v uma valorização discreta de posto 1 de um corpo K . A aplicação d_v de $K \times K$ em $\mathbb{R}_+$ definida por $d_v(x, y) = \exp(-v(x-y))$ para todos $x, y \in K$ é uma métrica e, portanto, define sobre K uma topologia Hausdorff, T_v . Para qualquer $x \in K$, o conjunto de todos os $v_\varepsilon(x) = \{y \in K; v(y-x) < \varepsilon, \varepsilon > 0\}$ é uma base de vizinhanças abertas de x . O corpo K com a topologia T_v é chamado de *corpo topológico valorizado*.

Dizemos que uma seqüência $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ de elementos de K é convergente para x se ela converge na topologia T_v , isto é, dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d_v(x_n, x) < \varepsilon$ sempre que $n \geq n_0$. Nesse caso escrevemos $\lim_{i \in \mathbb{N}} \{x_i\} = x$ e isso ocorre se, e somente se, a seqüência $\{v(x_i - x)\}_{i \in \mathbb{N}}$ converge a ∞ em $\mathbb{R}$ na topologia usual. Quando isso acontece $\{v(x_i)\}_{i \in \mathbb{N}}$ é estacionária; isto é, $v(x_i) = v(x_j)$ para todo $i, j \geq$ um certo n_0 . Neste caso $v(x) = v(\lim_{i \in \mathbb{N}} \{x_i\}) = v(x_{n_0}) = v(x_{n_0+1}) = \dots$ etc.

Dizemos que uma seqüência $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ é uma seqüência de Cauchy se ela é uma seqüência de Cauchy com respeito a d_v , isto é, para que qualquer inteiro N , existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $v(x_n - x_m) > N$ sempre que $n, m \geq n_0$. Toda seqüência convergente é uma seqüência

de Cauchy. Se toda sequência de Cauchy de elementos de um corpo K convergir em K dizemos que K é *completo*.

Seja v uma valorização de posto 1 de K . Então

- (i) O conjunto $\mathcal{C}$ de todas as sequências de Cauchy $X = \{x_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ de elementos de K é um anel com respeito à adição e multiplicação componente a componente;
- (ii) O conjunto $\mathcal{O}$ de todas as sequências que convergem a 0 é um ideal maximal de $\mathcal{C}$;
- (iii) A aplicação ϕ de $\mathcal{C}$ em $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ definida por $\phi X = \lim\{(v(x_i))\}_{i \in \mathbb{N}}$ tem as seguintes propriedades:
 $\phi(X+Y) = \phi X + \phi Y$; $\phi(X \cdot Y) = \phi X \cdot \phi Y$ e $\phi X = \infty \Leftrightarrow X \in \mathcal{O}$.

Chamamos de *corpo valorizado* ao par (K, v) onde K é um corpo e v uma valorização de K . Escrevemos $(K, v) \subseteq (L, w)$ se K é um subcorpo de L e $v = w|_K$. Um homomorfismo injetor λ de K em L é chamado de *imersão* de (K, v) em (L, w) se $w \circ \lambda = v$; nesse caso escreveremos $\lambda : (K, v) \rightarrow (L, w)$. Se K e L são munidos das topologias T_v e T_w , respectivamente então a aplicação λ é contínua. Chamaremos de *isomorfismo* a uma imersão sobrejetora.

Dizemos que o corpo valorizado (K, v) é *completo* se K é completo com respeito à topologia T_v definida pela valorização v . Enquanto que o completamento de (K, v) é uma imersão λ de (K, v) em (L, w) tal que (L, w) é completo e λK é denso em L .

com respeito a T_w . Nesse caso existe um isomorfismo α de (L, w) em (L', w') onde $(L', w') \supseteq (K, v)$ é o completamento no sentido usual.

A existência de completamentos é assegurada pela seguinte proposição demonstrada em [4]:

PROPOSIÇÃO 3: *Seja (K, v) um corpo valorizado e sejam $C, 0$ e ϕ como anteriormente. Então ϕ induz uma valorização $\hat{v}$ do corpo $\hat{K} = C/0$ e $\mu : (K, v) \rightarrow (\hat{K}, \hat{v})$ é um completamento onde $\mu(x) = \{x\}_i \in \mathbb{N}^{+0}$ para todo $x \in K$.*

EXEMPLO: O completamento $(\hat{Q}_p, \hat{v}_p)$ de (Q, v_p) é chamado corpo dos números p-ádicos.

TEOREMA 2: *Seja (K, v) completo e L/K uma extensão finita. Então existe no máximo uma valorização w de L que estende v e (L, w) é completo.*

DEMONSTRAÇÃO: Ver [4].

Se considerarmos L/K uma extensão algébrica não teremos (L, w) completo, mas ainda vale um resultado muito útil que é consequência do fato de que toda extensão algébrica é a união de suas subextensões finitas.

COROLÁRIO: *Seja (K, v) completo e L/K uma extensão algébrica.*

Então existe no máximo uma valorização de L que estende v .

3. EXTENSÕES DE ANÉIS DE VALORIZAÇÃO

Seja L/K uma extensão arbitrária de K . Sejam A e B anéis de valorização de K e L , respectivamente. Dizemos que B estende A se $A = B \cap K$.

Note que qualquer anel de valorização de L estende exatamente um anel de valorização de K , a saber, $B \cap K$. Enquanto que dado um anel de valorização A de K , existe pelo menos um anel de valorização B de L que estende A . Estaremos interessados no caso em que L/K é extensão algébrica.

PROPOSIÇÃO 4: Sejam A um anel de valorização de um corpo K , L/K uma extensão e D é o fecho integral de A em L . Então são equivalentes as seguintes condições:

- (i) L/K é uma extensão algébrica e D é um anel local (anel com um único ideal maximal);
- (ii) Existe um único anel de valorização de L que estende A ;
- (iii) D é um anel de valorização de L .

Nesse caso, D é o único anel de valorização de L que estende A .

Esse resultado junto com o Teorema 2 assegura que se L/K for extensão finita e (K, v) completo então D é completo.

Seja L/K uma extensão arbitrária e sejam v e w valoriza-

ções de K e L respectivamente. No caso de w ser uma extensão de v , isto é, $v = w/K$, o anel de valorização B de L correspondente a w estende o anel de valorização A de K correspondente a v . Qualquer valorização w de L estende exatamente uma valorização de K , a saber, w/K . Por outro lado, dada uma valorização v de K e um anel de valorização B de L que estende o anel de valorização A correspondente a v , a restrição a K de qualquer valorização w de L correspondente a B é equivalente apenas a v . Sendo assim, podemos mostrar que w pode ser escolhida de modo que $w/K = v$. Feito isso, o grupo de valores G de w contém o grupo de valores H de v . O par (G, H) é determinado por B e A a menos de isomorfismo de grupos ordenados, portanto o índice $(G:H)$ depende apenas de B e K . Esse índice é chamado de *índice de ramificação* e é denotado por $e_{B/K}$ ou simplesmente e . Chamamos de *grau residual* de B/K e denotamos por $f_{B/K}$ ou, simplesmente f , ao grau da extensão $[B/M_B : A/M_A]$.

Se L/K é uma extensão finita então $e \cdot f \leq [L:K]$ para qualquer anel de valorização B de L . Se K é completo e L/K separável, então vale $e \cdot f = [L:K]$. Com esse resultado, provamos o

TEOREMA 3: *Seja L/K uma extensão finita e A um anel de valorização discreto de K . Então qualquer anel de valorização B de L que estende A é discreto.*

DEMONSTRAÇÃO: Seja v uma valorização discreta de K correspondente a A e seja w uma valorização de L com grupo de valores

G , correspondente a B e que estende v . Pela afirmação anterior que precede esse teorema, $G/\mathbb{Z}$ é finito, logo existe $n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$, tal que a aplicação $\delta \mapsto n\delta$ ($\delta \in G$) é um isomorfismo de G num subgrupo discreto de $\mathbb{R}$. Portanto w é discreta. $\square$

A fim de demonstrarmos o Lema de Hensel vamos fixar algumas notações. Sejam v uma valorização discreta de posto 1 de um corpo K , A o seu anel de valorização e X uma indeterminada. A aplicação canônica $a \mapsto \bar{a}$ de A no corpo de resíduos $\bar{K}$ determina um homomorfismo de anéis de $A[X]$ em $\bar{K}[X]$ definido da seguinte maneira: se $f(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in A[X]$, então $f(X) \mapsto \bar{f}(X) = \bar{a}_0 + \bar{a}_1X + \dots + \bar{a}_nX^n \in \bar{K}[X]$. Quando $\bar{f}(X) \neq 0$ diremos que $f(X)$ é primitivo. Além disso, para $f(X) = a_0 + \dots + a_nX^n$ em $K[X]$ colocaremos $\bar{v}(f) = \min \{v(a_0), \dots, v(a_n)\}$.

LEMA DE HENSEL: *Seja (K, v) um corpo valorizado discreto completo e seja $f(X) \in A[X]$ um polinômio primitivo. Suponha que $G(X)$ e $H(X)$ são polinômios relativamente primos em $\bar{K}[X]$ tais que $\bar{f}(X) = G(X)H(X)$. Então existem $g(X)$ e $h(X)$ em $A[X]$ tais que*

- (i) $f(X) = g(X)h(X)$;
- (ii) $\bar{g}(X) = G(X)$, $\bar{h}(X) = H(X)$;
- (iii) $\partial g(X) = \partial G(X)$.

DEMONSTRAÇÃO: Sejam $\partial f(X) = s$ e $\partial G(X) = r$ de modo que $\partial \bar{f}(X) \leq s$ e $\partial H(X) \leq s-r$. Existem $g_1(X)$ e $h_1(X)$ em $A[X]$

tais que $\bar{g}_1(X) = G(X)$, $\bar{h}_1(X) = H(X)$, $\partial g_1(X) = \partial G(X)$ e $\partial h_1(X) = \partial H(X)$. Como $G(X)$ e $H(X)$ são primos entre si, existem $a(X)$ e $b(X)$ em $A[X]$ tais que

$$\bar{a}(X)G(X) + \bar{b}(X)H(X) = 1.$$

Então $f - g_1 h_1 \in M[X]$ e $ag_1 + bh_1 - 1 \in M[X]$. Seja $\varepsilon = \min \{ \bar{v}(f - g_1 h_1), \bar{v}(ag_1 + bh_1 - 1) \}$. Se $\varepsilon = \infty$ então $f(X) = g_1(X)h_1(X)$ e terminamos. Suponha portanto que $0 < \varepsilon < \infty$ e escolha $\pi \in K$ um elemento primo, tal que $v(\pi) = 1$. Assim $f \equiv g_1 h_1 \pmod{\pi}$, isto é, $f - g_1 h_1 \in \pi A[X]$ ou $\bar{v}(f - g_1 h_1) \geq \varepsilon \geq 1 = v(\pi)$ e temos $\bar{g}_1 = G$, $\bar{h}_1 = H$; $\partial g_1 = \partial G = r$ e $\partial h_1 \leq s - r$. Agora provamos por indução que para cada $i = 1, 2, \dots$ existem $g_i(X)$, $h_i(X) \in A[X]$ tais que

- (1) $f \equiv g_i h_i \pmod{\pi^i}$;
- (2) $g_i \equiv g_{i-1} \pmod{\pi^{i-1}}$, $h_i \equiv h_{i-1} \pmod{\pi^{i-1}}$, $i > 1$;
- (3) $\bar{g}_i = G$ e $\bar{h}_i = H$;
- (4) $\partial g_i = \partial G = r$ e $\partial h_i \leq s - r$.

Já demonstramos esse fato para $i = 1$. Suponha por indução que tenhamos construído os polinômios g_i e h_i para $i = n-1$, $n \geq 2$. Ponha $g_n(X) = g_{n-1}(X) + \pi^{n-1}u(X)$ e $h_n(X) = h_{n-1}(X) + \pi^{n-1}t(X)$ com os polinômios $u(X)$ e $t(X)$ em $A[X]$ a serem determinados. Assim as condições (2) e (3) se verificam para $i = n$. Como $g_n h_n = g_{n-1} h_{n-1} + \pi^{n-1}(g_{n-1} t + h_{n-1} u) + \pi^{2n-2} ut$ e $2n-2 \geq n$, temos

$$f \equiv g_n h_n \pmod{\pi^n} \Leftrightarrow f \equiv g_{n-1} h_{n-1} + \pi^{n-1} (g_{n-1} t + h_{n-1} u) \pmod{\pi^n} .$$

Por hipótese de indução,

$$w = \frac{f - g_{n-1} h_{n-1}}{\pi^{n-1}} \in A[X] ,$$

logo $f \equiv g_n h_n \pmod{\pi^n} \Leftrightarrow w \equiv g_{n-1} t + h_{n-1} u \pmod{\pi}$. Agora resta-nos escolher u e t . De $ag_1 + bh_1 \equiv 1 \pmod{\pi}$ temos $wa_1 + wb_1 \equiv w \pmod{\pi}$. Pelo algoritmo de Euclides podemos escrever $w(X)b(X) = q(X)g_1(X) + u(X)$ com $\partial u(X) < \partial g_1(X) = r$. Sem perda de generalidade podemos supor que $G(X)$ é mônico e tomar $g_1(X) \in A[X]$ como sendo mônico. Segue-se desse modo que $u(X) \in A[X]$. Logo $(wa + qh_1)g_1 + uh_1 \equiv w \pmod{\pi}$. Seja t o polinômio obtido substituindo-se todo coeficiente de $wa + qh_1$ divisível por π por 0. Então $t \in A[X]$ e

$$(*) \quad tg_1 + uh_1 \equiv w \pmod{\pi} .$$

Como $g_{n-1} \equiv g_1 \pmod{\pi}$ e $h_{n-1} \equiv h_1 \pmod{\pi}$, a condição (1) é satisfeita para $i = n$. Falta apenas mostrar (4). Temos $\partial g_n = \partial g_{n-1} = r$ pois $\partial u < r$. Também, se $\partial h_n > s-r$, então $\partial t > s-r$. Como $\partial w \leq \partial uh_1 \leq s$ e g_1 é mônico com $\partial g_1 = r$, a relação (*) dá uma contradição. Portanto $\partial h_n \leq s-r$ e a construção está completa.

Para $i = 1, 2, \dots$ escreva $g_i(X) = a_0^{(i)} + a_1^{(i)}X + \dots + a_r^{(i)}X^r$ onde $a_j^{(i)} \in A$. Então para $j = 0, 1, \dots, r$, $g_{i+1} \equiv g_i \pmod{\pi^i}$

implica $a_j^{(i+1)} \equiv a_j^{(i)} \pmod{\pi^i}$, logo $\{a_j^{(i)}\}_{i \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de Cauchy. Como (K, v) é completo, $\lim_{i \in \mathbb{N}} \{a_j^{(i)}\} = a_j \in A$. Ponha $g(X) = a_0 + a_1 X + \dots + a_r X^r$. Como $a_j \equiv a_j^{(i)} \pmod{\pi^i}$, temos $g(X) \equiv g_i(X) \pmod{\pi^i}$, $i = 1, 2, \dots$. Analogamente obtem-se $h(X) = b_0 + b_1 X + \dots + b_{s-r} X^{s-r} \in A[X]$ com $h(X) \equiv h_i(X) \pmod{\pi^i}$. Portanto $f(X) \equiv g_i(X)h_i(X) \equiv g(X)h(X) \pmod{\pi^i}$ para todo i , de modo que $f(X) = f(X)h(X)$. Finalmente, $\bar{g} = \bar{g}_i = G$, $\bar{h} = \bar{h}_i = H$ e, como $\partial g_1 \leq r$, $\partial h \leq s-r$ e $\partial f = \partial g + \partial h$ e segue-se que $\partial g = r = \partial G$. $\square$

OBSERVAÇÃO: Esse resultado pode ser obtido sem a hipótese adicional de $G(X)$ é mônico como é feito em [4].

Uma consequência importante do Lema de Hensel é dada pelo

COROLÁRIO: Suponha que $f(X) \in A[X]$ e que $\alpha \in \bar{K}$ é uma raiz simples de $\bar{f}(X)$. Então existe um elemento $a \in A$ tal que $\bar{a} = \alpha$ e $f(a) = 0$.

DEMONSTRAÇÃO: Por hipótese, $\bar{f}(X) = (X-\alpha)H(X)$ com $X-\alpha$ e $H(X)$ relativamente primos. Aplicando o Lema de Hensel temos $f(X) = g(X)h(X)$ onde $g(X)$ e $h(X) \in A[X]$ e $g(X)$ é mônico de grau 1. Portanto $g(X) = X-a$ para algum $a \in A$. $\square$

Dizemos que um corpo valorizado (K, v) é *henseliano* se ele verifica a propriedade descrita pelo Lema de Hensel.

O resultado seguinte é fundamental para o desenvolvimento do Capítulo 4.

TEOREMA 4: Sejam A um anel de valorização discreta completo de um corpo K , L/K uma extensão finita e $\bar{L}$ e $\bar{K}$ os corpos de resíduos de B e A , respectivamente. Suponha que $\bar{L}/\bar{K}$ é separável. Então B tem uma base sobre A composta de potências $1, x, \dots, x^{n-1}$ de um elemento x .

DEMONSTRAÇÃO: Sejam e o índice de ramificação de L/K e $f = [L:\bar{K}]$ tais que $n = ef$. Seja π um elemento primo de B e seja $x \in B$ um representante de um elemento primitivo para a extensão residual $\bar{L}/\bar{K}$. Os ef elementos $x^i \pi^j$, $0 \leq i < f$ e $0 \leq j < e$ são linearmente independentes sobre K . De fato, suponha que existem $a_{ij} \in K$ não todos nulos tais que

$$\sum_{i=0}^{f-1} \sum_{j=0}^{e-1} a_{ij} x^i \pi^j = 0.$$

Podemos supor que $w(a_{00} \pi^0) \leq w(a_{ij} \pi^j)$ para todos i, j onde w é a valorização associada a B tal que w/K é a valorização associada a A . Então a desigualdade é estrita para todo $j > 0$. Caso contrário, se $w(a_{00} \pi^0) = w(a_{ij} \pi^j)$ para algum $j > 0$, teríamos $w(\pi^0) - w(\pi^j) = w(a_{ij}) - w(a_{00}) \in w(K^*)$ o que significa $w(\pi^0) = w(\pi^j)$, uma contradição à escolha de π . Assim, da equação de dependência linear obtemos

$$\sum_{i=0}^{f-1} \frac{a_{i0} \pi^0}{a_{00} \pi^0} x^i = - \sum_{i=0}^{f-1} \sum_{j=1}^{e-1} \frac{a_{ij} \pi^j}{a_{00} \pi^0} x^i \in M_B.$$

Portanto $\sum_{i=0}^{f-1} \left(\frac{a_{i0} \pi^0}{a_{00} \pi^0} \right) x^{-i} = \bar{0}$ contradizendo a escolha de x .

Seja agora π_K um elemento primo de K . Então π e π_K são associados em B ; isto é, $\pi^e B = \pi_K B$. Seja $E = \sum_{i=0}^{f-1} Ax^i$. Temos então $B = E + \pi B$. Com efeito, $E + \pi B \subseteq B$; e se $\alpha \in B$ então $\bar{\alpha} = \bar{a}_0 + \bar{a}_1 x + \dots + \bar{a}_{f-1} x^{f-1}$ com $a_0, \dots, a_{f-1} \in A$ e assim $\alpha = a_0 + a_1 x + \dots + a_{f-1} x^{f-1} + \pi \alpha_0$ com $\alpha_0 \in A$. Segue-se que

$$B = E + \pi(E + \pi B) = \dots = E + \pi E + \dots + \pi^{e-1} E + \pi^e B.$$

Seja $M = E + \pi E + \dots + \pi^{e-1} E$. Observe que $M = \sum_{i,j} \theta Ax^i \pi^j$. É suficiente portanto mostrar que $M = B$. Primeiro temos

$$B = M + \pi^r B = M + \pi_K^r B = \dots = M + \pi_K^r M + \dots + \pi_K^{r-1} M + \pi_K^r B$$

para todo $r \geq 1$. Como $\pi_K^s E \subseteq E$ para todo $s \geq 1$, tem-se que $\pi_K^s M \subseteq M$ e daí $M = M + \pi_K^r M + \dots + \pi_K^{r-1} M$ para todo $r \geq 1$. Isso significa que $B = M + \pi_K^r B$ para todo $r \geq 1$. Como $\{\pi_K^r B / r = 1, 2, \dots\}$ é um sistema fundamental de vizinhanças de 0 em L , concluímos que M é denso em B . Por outro lado, $\{x^i \pi^j / 0 \leq i < f, 0 \leq j < e\}$ é parte de uma base de L sobre K e A é aberto e fechado em K . Como a aplicação $\xi \mapsto (a_{ij})_{i,j}$ onde $\xi = \sum_{i,j} a_{ij} x^i \pi^j$ com $a_{ij} \in A$ é um isomorfismo topológico (e algébrico) de M em $A^{(ef)}$, temos que $M = \sum_{i,j} \theta Ax^i \pi^j$ é fechado em L e em B . Portanto $M = B$.

Finalmente, o elemento x pode ser escolhido de modo que exista um polinômio mônico $R(X)$ de grau f com coeficientes em

A, tal que $R(x)$ seja um elemento primo de B. De fato, vamos primeiro escolher x tal que $\bar{L} = \bar{K}(\bar{x})$. Seja R um polinômio mônico com coeficientes em A cujo reduzido $\bar{R}$ é o polinômio minimal de $\bar{x}$. Então $w(R(x)) \geq 1$ pois a imagem de $R(x)$ em $\bar{L}$ é zero. Se vale a igualdade então $R(x)$ já é um elemento primo de B e acabamos. Caso contrário, $w(R(x)) \geq 2$. Seja h um elemento qualquer de valor 1 ($h \in M_B$). Pela fórmula de Taylor

$$R(x+h) = R(x) + hR'(x) + h^2b$$

com $b \in B$. Como $\bar{L}/\bar{K}$ é separável, $\bar{x}$ é raiz simples de $\bar{R}$ e temos $\bar{R}'(\bar{x}) \neq 0$, logo $R'(x)$ é inversível, daí $w(R'(x)) = 0$ e temos $w(hR'(x)) = w(h) + w(R'(x)) = w(h) = 1$. Como os outros termos em $R(x+h)$ tem valor ≥ 2 ,

$$w(R(x+h)) = \min \{w(R(x)), w(hR'(x)), w(h^2b)\} = 1.$$

e portanto $x+h$ é a solução.

Terminamos agora a demonstração do Teorema 4. Escolha um elemento x como acima e faça $\pi = R(x)$. Pelo que mostramos inicialmente, os produtos $x^i R(x)^j$, $0 \leq i < f$ e $0 \leq j < e$ formam uma base de B sobre A. Portanto $B = A[x]$ e como x satisfaz um polinômio mônico de grau n , segue-se que as potências $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ formam uma base. $\square$

Dizemos que uma extensão finita L/K é não-ramificada quando

- (i) $f = [L:K]$;
- (ii) $\bar{L}/\bar{K}$ é separável.

Uma extensão finita L/K é chamada de *totalmente ramificada* se $e = [L:K]$. Nesse caso nenhuma hipótese é feita sobre a separabilidade de $\bar{L}/\bar{K}$ pois L/K é totalmente ramificada se, e somente se, $f = 1$ se, e somente se, $\bar{L} = \bar{K}$. Não há modificação no corpo de resíduos.

O resultado seguinte, que usaremos na caracterização de extensões totalmente ramificadas L/K onde característica de $\bar{K}$ não divide $e = [L:K]$, no Capítulo 4, conhecido como *Lema de Krasner*, estabelece que $K(\alpha) = K(\beta)$ para quaisquer dois elementos separáveis sobre K que estão suficientemente próximos na topologia definida pela única extensão de uma valorização henseliana de K .

Seja Ω o fecho algébrico de K . Para qualquer $\alpha \in \Omega$ seja $C_\alpha = \{\sigma\alpha / \sigma \in G\}$ onde $G = \text{Aut}(\Omega/K)$.

LEMA DE KRASNER: *Sejam A um anel henseliano de K e w uma valorização de Ω tal que w/K corresponde a A . Se α e $\beta \in \Omega$ são tais que $w(\beta - \alpha) > \max \{w(\alpha' - \alpha); \alpha' \in C_\alpha \setminus \{\alpha\}\}$ então $K(\alpha, \beta)$ é puramente inseparável sobre $K(\beta)$. Além disso, se α é separável sobre K então $K(\alpha) \subseteq K(\beta)$.*

DEMONSTRAÇÃO: Como o grau de separabilidade de $K(\alpha, \beta)$ sobre $K(\beta)$ é igual ao número de $K(\beta)$ -monomorfismos $\sigma : K(\alpha, \beta) \rightarrow \Omega$

e qualquer desses ρ é a restrição de algum $K(\beta)$ - automorfismo de Ω , basta provar que qualquer $\sigma \in \text{Aut}(\Omega/K(\beta))$ induz identidade $i_{K(\alpha, \beta)}$ de $K(\alpha, \beta)$. De fato, temos $w \circ \sigma = w$, logo $w(\sigma\alpha - \alpha) = w((\beta - \alpha) - (\sigma\beta - \sigma\alpha)) \geq w(\beta - \alpha) > w(\alpha' - \alpha)$ para todo $\alpha' \in C_\alpha \setminus \{\alpha\}$. Isso implica $\sigma\alpha = \alpha$. Portanto $\sigma|_{K(\alpha, \beta)} = i_{K(\alpha, \beta)}$ para qualquer $\sigma \in \text{Aut}(\Omega/K(\beta))$. Assim, se α é separável sobre K , então $K(\alpha, \beta)$ é separável sobre $K(\beta)$ e como $[K(\alpha, \beta) : K(\beta)]$ é o número de $K(\beta)$ -monomorfismos de $K(\alpha, \beta)$ em Ω que é igual a 1, segue que $[K(\alpha, \beta) : K(\beta)] = 1$ ou seja $K(\alpha) \subseteq K(\beta)$.

3. COMPLETAMENTO DE ANEL LOCAL

Entendemos por *anel local* um anel noetheriano R com um único ideal maximal, que denotaremos por M .

Se R é um anel local então pelo Teorema de Krull, $\bigcap_{n=1}^{\infty} M^n = (0)$. Assim podemos definir sobre R uma topologia tomando as potências $\{M^n\}$ como base de vizinhanças de 0 . Esta é a topologia M -ádica do anel local R . $\bigcap_{n=1}^{\infty} M^n = (0)$ significa que R com essa topologia é um espaço Hausdorff.

Uma sequência $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de elementos de R é uma sequência de Cauchy se dado um número natural N , existir $n_0(N)$ tal que $a_n - a_{n+1} \in M^N$, sempre que $n \geq n_0(N)$.

Dizemos que R é completo se ele é completo na topologia M -ádica ou, equivalentemente, se toda sequência de Cauchy de elementos de R converge em R .

CAPÍTULO II

CORPOS COMPLETOS E O TEOREMA DE REPRESENTAÇÃO

Neste capítulo desenvolvemos o bem conhecido teorema de representação por séries de elementos de corpos valorizados completos a valorizações discretas. Tratamos de exemplos canônicos, embora não falte um ponto de vista original no caso de alguns exemplos. O teorema de representação citado aqui é um resultado chave para compreender o fecho algébrico do corpo de séries formais $k((T))$ sendo k algebricamente fechado. Teorema este desenvolvido no capítulo IV.

Seja A um anel de valorização discreto completo com corpo de frações K e corpo de resíduos $\bar{K}$. Fixemos um elemento primo π de A e escolhamos o conjunto S de representantes de $\bar{K}$ em A tal que $0, 1 \in S$, embora isto não seja necessário.

No que segue, a convergência se refere à topologia do corpo valorizado conforme parágrafo 2, Capítulo I.

LEMA 1: A série $\sum_{n=0}^{\infty} s_n \pi^n$ com $s_n \in S$ é convergente em K .

DEMONSTRAÇÃO: Considere a sequência de somas parciais $\left\{ \sum_{n=0}^m s_n \pi^n \right\}_{m=0}^{\infty} = \{x_m\}$. Seja r o primeiro número natural com

$s_r \neq 0$. Então $v(x_m) = r$ para todo $m \geq 0$ e, se $m \leq m'$, $v(x_m, -x_m) \geq m+1$. Logo, dado N suficientemente grande, se $r_0 = N$ então $\forall m, m' \geq r_0$ com $m \leq m'$, $v(x_m, -x_m) > r_0$. Portanto $\{x_m\}$ é uma consequência de Cauchy. Como K é completo, ela converge e seu limite é $\sum_{n=0}^{\infty} s_n \pi^n$. $\square$

LEMA 2: Se $r \in \mathbb{Z}$ e $s_n \in S$ para todo $n \geq r$, então $\sum_{n=r}^{\infty} s_n \pi^n$ é convergente em K .

DEMONSTRAÇÃO: Se $r \geq 0$ esse resultado segue do Lema 1. Seja $r < 0$. Pelo Lema 1, $\sum_{n=0}^{\infty} s_n \pi^n = x$, digamos. Então $\sum_{n=r}^{\infty} s_n \pi^n = x + \sum_{n=r}^{-1} s_n \pi^n$ mostrando a convergência de $\sum_{n=r}^{\infty} s_n \pi^n$. $\square$

O seguinte resultado proporciona uma representação eficiente de elementos de um corpo completo com respeito à valorização discreta. Ela sugere que os corpos desse gênero tem uma estrutura mais simples a tratar.

TEOREMA 1 (TEOREMA DE REPRESENTAÇÃO): Todo elemento $a \in A$ pode ser escrito de modo único como uma série convergente $a = \sum_{n=0}^{\infty} s_n \pi^n$, com $s_n \in S$. Analogamente, todo elemento $x \in K$ pode ser escrito como $x = \sum_{n=r}^{\infty} s_n \pi^n$, onde $v(x) = r = \min \{n \in \mathbb{Z}; s_n \neq 0\}$.

DEMONSTRAÇÃO: Seja $a \in A$. Por definição do conjunto S de representantes, existe um $s_0 \in S$, o qual pode ser 0, tal que $a - s_0 \equiv 0 \pmod{\pi}$. Logo $a = s_0 + a_1\pi$ para algum $a_1 \in A$. Suponha, por indução, que encontramos $s_{n-1} \in S$ tal que $a = s_0 + s_1\pi + \dots + s_{n-1}\pi^{n-1} + a_n\pi^n$ para algum $a_n \in A$. Então existe $s_n \in S$ tal que $a_n - s_n \equiv 0 \pmod{\pi}$, o que implica na existência de $a_{n+1} \in A$ tal que $a_n = s_n + a_{n+1}\pi$. Da hipótese de indução segue-se que $a = s_0 + s_1\pi + \dots + (s_n + a_{n+1}\pi)\pi^n = s_0 + s_1\pi + \dots + s_n\pi^n + a_{n+1}\pi^{n+1}$. Assim, por indução, temos uma sequência $\{s_n\}$ de elementos de S . Considere agora a série $\sum_{n=0}^{\infty} s_n\pi^n$. Esta série converge pelo Lema 1. Mostremos que $a = \sum_{n=0}^{\infty} s_n\pi^n$. Ora, $a = s_0 + s_1\pi + \dots + s_n\pi^n + a_{n+1}\pi^{n+1}$. Se $\{x_m\}$ é a sequência das somas parciais do Lema 1 então $v(a - x_m) = v(a_{m+1}\pi^{m+1}) \geq m+1$. Se N é suficientemente grande então para todo $m \geq N$, $v(a - x_m) > N$. Logo $\lim \{x_m\} = a$, ou seja, $a = \sum_{n=0}^{\infty} s_n\pi^n$. Isso mostra que todo elemento $a \in A$ é da forma $a = \sum_{n=0}^{\infty} s_n\pi^n$. Se $x \in K$ então $v(x) = r = v(\pi^{-r})$. Daí $v(x\pi^{-r}) \geq 0$. Logo $x\pi^{-r} \in A$, donde $x\pi^{-r} = \sum_{n=0}^{\infty} s_n\pi^n$. Segue-se que $x = \sum_{n=0}^{\infty} s_n\pi^{n+r} = \sum_{n=r}^{\infty} s'_n\pi^n$. Finalmente, observe que se $v(x) = r$, então $v(x\pi^{-r}) = 0$. Daí $x\pi^{-r} = s_0 + a_1\pi$ com $s_0 \neq 0$. Logo $x = s_r\pi^r + s_{r+1}\pi^{r+1} + \dots$ com $s_r \neq 0$. Portanto, $v(x) = \min \{n \in \mathbb{Z}; s_n \neq 0\}$.

Para estabelecer a unicidade da representação acima, observe que pelo Lema 1, toda sequência $\sum_{n=0}^{\infty} t_n\pi^n$ com $t_n \in S$ converge

em K . Assim, se $a = \sum_{n=0}^{\infty} s_n \pi^n = \sum_{n=0}^{\infty} t_n \pi^n$ com s_n e t_n em S , então $\sum_{n=0}^{\infty} (s_n - t_n) \pi^n = 0$. Se $s_n - t_n \neq 0$ para algum $n \geq 0$, seja r_0 o primeiro inteiro tal que $s_{r_0} - t_{r_0} \neq 0$. Então $v(\sum_{n=0}^{\infty} (s_n - t_n) \pi^n) = r_0$ enquanto que $v(0) = \infty$, uma contradição. $\square$

OBSERVAÇÃO: A demonstração não requer que 0 e 1 estejam em S . Por exemplo, se escolhemos π e 1 como representantes de $\bar{0}$ e $\bar{1}$, respectivamente em $\bar{K}$, então a representação de 0 é a seguinte: $0 = \pi \cdot 1 - 1 \cdot \pi + \pi \cdot \pi^2 - 1 \cdot \pi^3 + \pi \cdot \pi^4 - 1 \cdot \pi^5 + \dots$. Se escolhemos 0 como representante de $\bar{0}$ então $0 = \sum_{n=0}^{\infty} s_n \pi^n$ onde $s_n = 0$ para todo $n \geq 0$. Por isso escolhemos S tal que 0 e 1 pertencessem a S .

A escolha adequada do conjunto S de representantes é importante para uma melhor compreensão do corpo completo K e melhor apresentação dos seus elementos. Por exemplo, seja $K = \mathbb{Q}_p$ o corpo dos números p -ádicos, ou seja, o completamento do corpo $\mathbb{Q}$ dos racionais com relação à valorização p -ádica. Então, $\bar{K} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, e uma escolha para S pode ser $S = \{0, 1, \dots, p-1\}$. Assim, todo elemento $a \in K$ pode ser escrito de maneira única como $a = \sum_{n \geq r} s_n p^n$, $r \in \mathbb{Z}$ e $s_n \in \{0, 1, \dots, p-1\}$. Nesse caso, a série $\sum_{n \geq r} s_n p^n$ é chamada de desenvolvimento p -ádico ou representação p -ádica de a . Uma outra escolha é obtida da seguinte maneira: como A é henseliano e $\bar{K}$ é um corpo de raízes de $x^{p-1} - 1$, K contém todas as raízes $(p-1)$ -ésimas da unidade, $1, w, \dots, w^{p-2}$.

Consideramos então o conjunto de representantes $T = \{0, 1, w, \dots, w^{p-2}\}$.

Duas perguntas interessantes surgem naturalmente: Se $x = \sum_{n \geq r} s_n p^n$ com $s_n \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ então quais as condições para que x seja (i) racional e (ii) algébrico sobre $\mathbb{Q}$? Elas são relevantes pois $\mathbb{Q}_p | \mathbb{Q}$ é extensão transcendente. De fato, se (K, v) é um corpo valorizado completo discreto e S é um conjunto de representantes de $\bar{K}$; como $\#K = \#Y$ onde $Y = \{f: \mathbb{Z} \rightarrow S; f(n) = 0 \text{ quase sempre se } n < 0\}$ e $\#Y > (\#S)^{\aleph_0} \geq 2^{\aleph_0}$, temos que K é não-enumerável. Em particular, $\mathbb{Q}_p$ é não-enumerável e, portanto, $\mathbb{Q}_p | \mathbb{Q}$ é extensão transcendente.

A segunda pergunta é certamente difícil e permanece em aberto até hoje. Vamos responder a primeira:

PROPOSIÇÃO 1: Um número p -ádico $x = \sum_{n \geq n_0} a_n p^n$ é racional se, e somente se, o seu desenvolvimento p -ádico é periódico, isto é, existem inteiros $h \geq n_0$ e $\ell \geq 1$ tais que $a_n = a_{n+\ell}$ para $n \geq h$.

DEMONSTRAÇÃO: Basta mostrar que $y = \sum_{n \geq 0} a_n p^n$ é racional se, e somente se, a série $\sum_{n \geq 0} a_n p^n$ é periódica, pois qualquer número p -ádico x é da forma $x = p^{n_0} \cdot y$ com $n_0 \in \mathbb{Z}$. Suponhamos inicialmente que a série $\sum_{n \geq 0} a_n p^n$ é periódica. Então existem inteiros $h \geq 0$ e $\ell \geq 1$ tais que $a_n = a_{n+\ell}$ para todo $n \geq h$. Escrevamos $b = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots + a_{h-1} p^{h-1}$ e

$c = p^h (a_h + a_{h+1}p + \dots + a_{h+k-1} p^{k-1})$. Então $y = b + c(1 + p^k + p^{2k} + \dots)$. Como a série $1 + p^k + p^{2k} + \dots$ converge e sua soma é $\frac{1}{1 - p^k}$, te-

mos $y = b + \frac{c}{1 - p^k}$ que é racional pois b e $c \in \mathbb{Z}$. Reciprocamen-

te, se y é racional então $x = p^{n_0} \frac{r}{s}$ onde n_0, r e $s \in \mathbb{Z}$ com $s > 0$, $(r, s) = 1$ e $(p, r) = (p, s) = 1$. Basta mostrar então que

o desenvolvimento p -ádico de $y = \frac{r}{s}$ é periódico. Observe inicialmente que se $0 \leq c < p^m - 1$ então $\frac{c}{1 - p^m}$ é periódico. De fa-

to, da condição $0 \leq c < p^m - 1$ tem-se que c é da forma $c = c_0 + c_1 p + \dots + c_{m-1} p^{m-1}$ onde $c_i \in \{0, 1, \dots, p-1\}$. Então

$$\begin{aligned} \frac{c}{1 - p^m} &= (c_0 + c_1 p + \dots + c_{m-1} p^{m-1}) (1 + p^m + p^{2m} + \dots) = \\ &= c_0 + c_1 p + \dots + c_{m-1} p^{m-1} + c_0 p^m + c_1 p^{m+1} + \dots + c_{m-1} p^{2m-1} + c_0 p^{2m} + \dots \end{aligned}$$

é uma série periódica. Se $b \geq 0$ e $0 \leq c < p^m - 1$ são inteiros, então $b + \frac{c}{p - p^m}$ também tem desenvolvimento periódico pois a série de b é finita. Afirmo que todo número racional $\frac{r}{s} \neq 0$, com

$s > 0$, $(r, s) = (p, r) = (p, s) = 1$ é da forma $\frac{r}{s} = b + \frac{c}{1 - p^m}$ com

$b \geq 0$ e $0 \leq c < p^m - 1$ para algum $m \geq 1$. Com efeito, sendo $(p, s) = 1$ existem inteiros m e $t \geq 1$ tais que $p^m - 1 = st$, pois

$(p, s) = 1$ implica $\bar{p} \in \mathbb{P}(s)$, grupo multiplicativo dos inteiros primos em relação a s com multiplicação módulo s , e basta tomar mos $m = 0(\bar{p})$. Daí $p^m \equiv 1 \pmod{s}$ ou seja $p^m - 1 = st$. Então

$\frac{r}{s} = \frac{rt}{st} = \frac{rt}{p^m - 1}$. Se $r > 0$, pelo Algoritmo de Euclides existem

inteiros $b' \geq 0$ e $0 \leq c' < p^m - 1$ tais que $rt = b'(p^m - 1) + c'$ o que implica $\frac{rt}{p^m - 1} = b' + \frac{c'}{p^m - 1}$. Se $c' = 0$, $\frac{r}{s}$ é número natural e logo periódico. Se $c > 0$,

$$\frac{rt}{p^m - 1} = (b' + 1) + \frac{c' - (p^m - 1)}{p^m - 1} = (b' + 1) - \frac{(p^m - 1) - c'}{p^m - 1} = b + \frac{c}{1 - p^m}$$

onde $b = b' + 1 \geq 0$ e $c = (p^m - 1) - c'$ com $0 \leq c < p^m - 1$. Assim obtemos a forma desejada de $\frac{r}{s}$. Se $r < 0$ então $\frac{r}{s} = -\frac{r'}{s}$ com $r' > 0$. Pelo primeiro caso $\frac{r'}{s}$ é periódico e pelo lema a seguir $\frac{r}{s} = -\frac{r'}{s}$ é também periódico.

LEMA 3: Se um número p -ádico x tem representação periódica, o mesmo acontece com $-x$.

DEMONSTRAÇÃO: É suficiente considerar o caso onde $x = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots$ com $a_0 \neq 0$. Suponhamos que o período de x seja ℓ e que $a_h, a_{h+1}, \dots, a_{h+\ell-1}$ se repetem. Então

$$x = a_0 + a_1 p + \dots + a_{h-1} p^{h-1} + a_h p^h + \dots + a_{h+\ell-1} p^{h+\ell-1} + a_{h+\ell} p^{h+\ell} + \dots$$

onde $a_n = a_{n+\ell} \forall n \geq h$. Ora, pela adição em $\mathbb{Q}_p$, $-x = b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + \dots$, onde $a_0 + b_0 \equiv 0 \pmod{p}$ etc., e se $v(x) = r$, então $a_r + b_r \equiv 0 \pmod{p}$ e $a_i + b_i + 1 \equiv 0 \pmod{p} \forall i > r$. Daí $b_{n+\ell} = b_n, \forall n \geq h+\ell$. Assim $-x$ também tem representação periódica. $\square$

EXEMPLO: Tome $x = 1 + 2p + 3p^2 + p^3 + 2p^4 + 3p^5 + \dots$ onde $p = 5$.
 x tem período 3 e $h = 0$ acima.

$$-x = 4 + 2p + p^2 + 3p^3 + 2p^4 + p^5 + 3p^6 + 2p^7 + p^8 + \dots,$$

o qual tem período 3 e $h = 3$.

Consideremos agora o conjunto de representantes $T = \{0, 1, w, \dots, w^{p-2}\}$. A periodicidade da representação de um elemento de Q_p é invariante com relação à mudança do conjunto de representantes? A resposta é negativa: mostraremos adiante que em Q_5 , 2 não tem representação periódica quando usamos T , embora isso ocorra quando usamos o conjunto S , pois 2 é inteiro e o seu desenvolvimento 5-ádico é uma série finita, portanto periódica.

Antes, porém, estudemos uma situação mais geral. Seja K um corpo completo com respeito a uma valorização discreta e suponhamos que o corpo de resíduos $\bar{K}$ é finito. Seja S um conjunto de representantes de $\bar{K}$ contendo 0 e 1. Seja D o conjunto de todas as séries de K escritas usando apenas os representantes 0 e 1.

Dada uma série $f = \sum_{n \geq n_0} a_n \pi^n$, chamamos de suporte de f e de notamos por $\text{sup}(f)$ ao conjunto $\{n \in \mathbb{Z}; a_n \neq 0\}$.

PROPOSIÇÃO 2: Com a hipótese de que $\bar{K}$ é finito, se $S = \{0, 1, n_2, \dots, n_\ell\}$ então toda série f de K pode ser escrita de maneira única como uma soma finita $f = d_1 + n_2 d_2 + \dots + n_\ell d_\ell$ com $d_i \in D$ pa

ra todo $i \in \{1, 2, \dots, \ell\}$ distintos com suportes disjuntos dois a dois.

DEMONSTRAÇÃO: Seja $f = \sum_{n \geq n_0} f(n) \pi^n$ onde $f(n) = a_n$. Considere as funções $f_1, f_2, \dots, f_\ell$ definidas como segue:

$$f_1(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } f(n) \notin \{0, 1\} \\ f(n), & \text{se } f(n) \in \{0, 1\} \end{cases}$$

e, para $1 < i \leq \ell$,

$$f_i(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } f(n) \notin \{0, n_i\} \\ f(n), & \text{se } f(n) \in \{0, n_i\} \end{cases}$$

$f_1, f_2, \dots, f_\ell$ são séries com coeficientes em S , portanto, convergentes. Como K é completo, pertencem a K . É evidente que $\sup(f_i) \cap \sup(f_j) = \emptyset$ se $i \neq j$, $0 \leq i, j \leq \ell$, e que $f = f_1 + \dots + f_\ell$. Ora $f_i = n_i d_i$ com $d_i \in D$. Logo $f = d_1 + n_2 d_2 + \dots + n_\ell d_\ell$ com suportes dos d_i disjuntos dois a dois. A unicidade dessa representação segue do fato de serem disjuntos dois a dois os suportes dos d_i . $\square$

Se $\bar{K}$ é finito, chamamos a representação $f = d_1 + n_2 d_2 + \dots + n_\ell d_\ell$ onde $n_i \in S$ e $d_i \in D$ $i \in \{1, \dots, \ell\}$ de representação padrão de f por representantes de S . Observe que os suportes de f_i são disjuntos dois a dois.

PROPOSIÇÃO 3: Uma série f é periódica se, e somente se, para todos os componentes f_i da representação padrão de f , os suportes de f_i eventualmente formam progressões aritméticas de uma mesma razão r .

DEMONSTRAÇÃO: Seja $f = f_1 + f_2 + \dots + f_\ell$ como acima. Se $i \neq j$, então $\text{sup}(f_i) \cap \text{sup}(f_j) = \emptyset$. Se f é periódica, então existem inteiros m e r tais que para todo $n \geq m$, $a_n = a_{n+r}$. Logo $\text{sup}(f_i)$ contém uma progressão aritmética com a razão r , o termo inicial estando entre a_n e a_{n+r-1} . Reciprocamente, se os $\text{sup}(f_i)$ contêm eventualmente progressões aritméticas de uma mesma razão r , então existe um inteiro m tal que $a_n = a_{n+r} \forall n \geq m$, pois no caso n pertence a apenas um dos $\text{sup}(f_i)$, digamos $f_t = n_t d_t$, então $a_n = n_t = a_{n+r}$, etc. Logo f é periódica. $\square$

Provemos agora que 2 não tem representação periódica em $\mathbb{Q}_5$ quando usamos o conjunto de representantes $T = \{0, \pm 1, \pm w\}$. Se isso ocorresse, existiriam d_1, d_2, d_3 e d_4 em D , periódicos, portanto racionais (Proposição 1) tais que $2 = d_1 + wd_2 - d_3 - wd_4$. Como 1 e w são linearmente independentes sobre $\mathbb{Q}$, segue-se da igualdade acima que $2 = d_1 - d_3$ e $d_2 - d_4 = 0$. Logo $d_1 = 2 + d_3$. Ora, d_1 e d_3 têm suportes disjuntos e $d_1 = \sum a_n 5^n$ e $d_3 = \sum b_n 5^n$ onde $a_n, b_n \in \{0, 1\}$, e $a_n b_n = 0$. De $d_1 = 2 + d_3$, tem-se $a_0 = 2 + b_0$ e $a_n = b_n \forall n \neq 0$. Se $b_0 = 1$, $a_0 = 3 \notin \{0, 1\}$ - impossível. Se $b_0 = 0$, $a_0 = 2 \notin \{0, 1\}$ - impossível também.

Assim 2 não é periódico, se usamos T como conjunto de representantes.

A caracterização dos elementos de Q_p que têm representação periódica com coeficientes em $T = \{0, 1, w, \dots, w^{p-2}\} = \{0, t_0, t_1, \dots, t_{p-2}\}$ é dada pela proposição seguinte que é consequência das Proposições 1 e 3.

PROPOSIÇÃO 4: *Seja $D = D \cap Q$. Um elemento $f \in Q_p$ tem representação periódica no sistema T se, e somente se, existem $d_1, \dots, d_{p-2} \in D$ tais que $f = \sum_{i=0}^{p-2} t_i d_i$ é a representação padrão de f com representantes em T .*

Outros completamentos de corpos obtidos de maneira análoga, através de valorização discreta, e também importantes na Matemática, são os completamentos de $K(X)$ que estudaremos a seguir.

Para isso, definamos as valorizações de $K(X)$ triviais sobre K . Seja $p(X)$ um polinômio irredutível sobre K . Então a aplicação $v_p(X)$ que a cada elemento não nulo $f(X)$ em $K(X)$ associa o inteiro $v_p(X)(f(X))$, potência de $p(X)$ na decomposição de $f(X)$ em fatores irredutíveis, e $v_p(X)(0) = \infty$ é uma valorização discreta denominada valorização $p(X)$ -ádica. Outra valorização discreta de $K(X)$ é a v_∞ que a cada $f(X)$ não nulo associa o inteiro $-3f(X)$ e $v_\infty(0) = \infty$.

A proposição seguinte (Ver McCarthy, P.J., "Algebraic Extensions of Fields"), assegura que além das valorizações mencionadas

acima, $K(X)$ possui apenas uma valorização trivial sobre K , a saber, a valorização trivial de $K(X)$.

PROPOSIÇÃO 5: *Seja K um corpo, X uma indeterminada e $K(X)$ o corpo das funções racionais sobre K . Seja v uma valorização de $K(X)$ trivial sobre K . Então v é equivalente a uma das seguintes valorizações:*

- i) a valorização trivial de $K(X)$;
- ii) $v_{p(X)}$, a valorização $p(X)$ -ádica;
- iii) v_∞ , a valorização dada pelo grau.

Passamos a tratar da escolha de representantes para os corpos de resíduos.

PROPOSIÇÃO 6: *Seja v a valorização $p(X)$ -ádica do corpo $K(X)$. Então o corpo de resíduos $\overline{K(X)}_{p(X)}$ é canonicamente isomorfo a $K(\alpha)$, onde α é uma raiz de $p(X)$ num fecho algébrico de K . Em particular, $\text{car}(K(X)) = \text{car}(\overline{K(X)}_{p(X)})$. Se K é algebricamente fechado então para todo polinômio irredutível $p(X)$ (necessariamente linear), o corpo de resíduos correspondente é o próprio K . Se K é perfeito então $\overline{K(X)}_{p(X)}$ também o é. Um conjunto natural de representantes de $\overline{K(X)}_{p(X)}$ é dado por $S = \{f(X) \in K[X]; \partial f(X) < \partial p(X)\} \cup \{0\}$.*

DEMONSTRAÇÃO: Sejam

$$A_v = \left\{ \frac{f(X)}{g(X)}; f(X), g(X) \in K[X], g(X) \neq 0 \text{ e } p(X) \nmid g(X) \right\}$$

e $M_V = \left\{ \frac{f(X)}{g(X)} \in A_V; p(X) \mid f(X) \right\}$. Seja $\varphi: A_V \rightarrow K(\alpha)$ que leva $\frac{f(X)}{g(X)}$ em $\frac{f(\alpha)}{g(\alpha)}$. Como $p(X)$ não divide $g(X)$, $g(\alpha) \neq 0$. É evidente que φ é um homomorfismo sobrejetor. Seu núcleo

$$\ker \varphi = \left\{ \frac{f(X)}{g(X)} \in A_V; \varphi\left(\frac{f(X)}{g(X)}\right) = 0 \right\}$$

é M_V . De fato, se $\varphi\left(\frac{f(X)}{g(X)}\right) = \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} = 0$, então $f(\alpha) = 0$ e $p(X)$ divide $f(X)$, donde $\frac{f(X)}{g(X)} \in M_V$ e $\ker \varphi \subseteq M_V$. Como $M_V \subseteq \ker \varphi$

segue-se a igualdade. Pelo teorema de isomorfismo $\overline{K(X)} = A_V/M_V = K(\alpha)$.

Observe que $K \subseteq \overline{K(X)}$. Segue-se que $\text{car}(\overline{K(X)}) = \text{car}(K(X))$. Se

K é algebricamente fechado e $p(X) \in K(X)$ então qualquer raiz α de $p(X)$ está em K e pelo que foi mostrado anteriormente,

$\overline{K(X)} = K(\alpha) = K$. Suponhamos agora que o corpo K é perfeito. Se

$\overline{K(X)}$ não fosse perfeito existiria $\beta \in L$ tal que β é inseparável sobre $\overline{K(X)}$. O isomorfismo φ de $\overline{K(X)}$ em $K(\alpha)$ se estende

a um $\overline{K(X)}$ -isomorfismo $\hat{\varphi}$ de $\overline{K(X)}(\beta)$ num fecho algébrico de

$K(\alpha)$. Logo $\hat{\varphi}(\beta) = \lambda$ é inseparável sobre $K(\alpha)$ o que é absurdo, pois K é perfeito. $S = \{f(X) \in K[X]; \partial f(X) < \partial p(X)\} \cup \{0\}$

é de fato um conjunto de representantes para $\overline{K(X)}$. De fato,

$K(\alpha) \simeq \frac{K[X]}{(p(X))}$ e como $K[X] \subseteq A_V$, segue que o homomorfismo

$\varphi: A_V \rightarrow K(\alpha)$ restrito a S é uma aplicação bijetora, via a divisão Euclideana. Assim S é um conjunto de representantes de $\overline{K(X)}_{p(X)}$.

Segue o análogo da Proposição 6 para a valorização dada pelo grau.

PROPOSIÇÃO 7: *Seja v_∞ a valorização de $K(X)$, dada pelo grau. Então o corpo de resíduos $\overline{K(X)}_{v_\infty}$ é canonicamente isomorfo a K .*

DEMONSTRAÇÃO: Com efeito,

$$A_{v_\infty} = \left\{ \frac{f(X)}{g(X)} \in K(X); (f(X), g(X)) = 1 \text{ e } \partial g(X) \geq \partial f(X) \right\} \cup \{0\}.$$

Logo,

$$\overline{K(X)}_{v_\infty} = A_{v_\infty} / M_{v_\infty} = \left\{ \frac{f(X)}{g(X)} + M_{v_\infty}; (f(X), g(X)) = 1 \text{ e } \partial g(X) = \partial f(X) \right\} \cup \{M_{v_\infty}\}.$$

Ora, dado $\frac{f(X)}{g(X)}$ em $K(X)$ tal que $(f(X), g(X)) = 1$ e $\partial f(X) = \partial g(X)$, pelo Algoritmo de Euclides existe $s \in K$ e $r(X) \in K[X]$ tais que $f(X) = s.g(X) + r(X)$ com $\partial r(X) < \partial g(X)$ ou $r(X) = 0$. A aplicação φ de $\overline{K(X)}_{v_\infty}$ em K que associa a cada elemento $\frac{f(X)}{g(X)} + M_{v_\infty}$ o elemento s como acima é isomorfismo de $\overline{K(X)}_{v_\infty}$ sobre K . Assim um conjunto natural de representantes é dado por K .

Seguem-se os análogos ao resultado da Proposição 1 sobre representação periódica nos corpos $K(X)_{p(X)}$ e $K(X)_\infty$.

PROPOSIÇÃO 8: *Seja $p(X)$ um polinômio irredutível sobre o corpo K . Então um elemento ζ de $K(X)_{p(X)}$ admite representação periódica*

dica-se, e somente se, ζ é uma função racional da forma

$$\zeta = \frac{f(X)}{p^r(X)(1-p^\ell(X))} \quad \text{onde } f(X) \text{ é um polinômio, } r \geq 0 \text{ e } \ell \geq 1 \text{ são inteiros.}$$

DEMONSTRAÇÃO: Sabemos que ζ é escrito como $\zeta = \sum_{n \geq n_0} a_n p^n(X)$ em $K(X)_{p(X)}$. Suponhamos que esta representação seja periódica. Considere inicialmente $n_0 \geq 0$. Então existem inteiros $h \geq 0$ e $\ell \geq 1$ tais que

$$\zeta = a_0 + a_1 p(X) + \dots + a_{h-1} p^{h-1}(X) + a_h p^h(X) + \dots + a_{h+\ell-1} p^{h+\ell-1}(X) + a_{h+\ell} p^{h+\ell}(X) + \dots$$

onde $a_{n+\ell} = a_n$ para todo $n \geq h$. Seja $y = a_h p^h(X) + \dots + a_{h+\ell-1} p^{h+\ell-1}(X)$. Então

$$\begin{aligned} \zeta &= a_0 + a_1 p(X) + \dots + a_{h-1} p^{h-1}(X) + y(1 + p^\ell(X) + p^{2\ell}(X) + \dots) \\ &= a_0 + a_1 p(X) + \dots + a_{h-1} p^{h-1}(X) + \frac{y}{1 - p^\ell(X)} \end{aligned}$$

pois a série $1 + p^\ell(X) + p^{2\ell}(X) + \dots$ converge para $\frac{1}{1 - p^\ell(X)}$ na topologia $p(X)$ -ádica do corpo completo $K(X)_{p(X)}$. Assim $\zeta = \frac{f(X)}{1 - p^\ell(X)}$ onde $f(X)$ é um polinômio.

Reciprocamente, a representação no corpo completo $K(X)_{p(X)}$

de uma função racional $\frac{f(X)}{1-p^l(X)}$ onde $f(X)$ é um polinômio e $l \geq 1$ é inteiro, é evidentemente periódica.

Considere agora $n_0 < 0$. Se $\zeta = \sum_{n \geq n_0} a_n p^n(X)$ é uma representação periódica, então existem inteiros $h \geq n_0$ e $l \geq 1$ tais que

$$\zeta = a_{n_0} p^{n_0}(X) + \dots + a_{-1} p^{-1}(X) + a_0 + a_1 p(X) + \dots + a_{h-1} p^{h-1}(X) + a_h p^h(X) + \dots$$

onde $a_{n+l} = a_n$ para todo $n \geq h$. Sejam $r = -n_0 > 0$ e $y = a_h p^h(X) + \dots + a_{h+l-1} p^{h+l-1}(X)$. Pelo mesmo argumento anterior

$$\zeta = \frac{1}{p^r(X)} (a_{-r} + \dots + a_{-1} p^{r-1}(X)) + a_0 + \dots + a_{h-1} p^{h-1}(X) + \frac{y}{1-p^l(X)}.$$

Portanto,

$$\zeta = \frac{f(X)}{(p^r(X) (1-p^l(X)))}$$

onde $f(X)$ é um polinômio.

Reciprocamente, a representação no corpo completo $K(X)_{p(X)}$ de uma função racional como acima é também periódica.

Observe que nem toda função racional é do tipo descrito acima. Com efeito, considere por exemplo K um corpo de característica zero, $p(X) = X-1$ um polinômio de $K(X)$ e a função racio-

nal $\frac{1}{2-(X-1)} = \frac{1}{3-X}$. Se $\frac{1}{3-X} = \frac{f(X)}{p^r(X)(1-p^\ell(X))}$ para algum polinômio $f(X)$ e inteiros $r \geq 0$ e $\ell \geq 1$, então $p^r(X)(1-p^\ell(X)) = (3-X)f(X)$. Logo $(3-X) | p^r(X)(1-p^\ell(X))$. Como $(3-X)$ é irreduzível sobre K , $(3-X) | p^r(X)$ ou $(3-X) | (1-p^\ell(X))$. Como $p(X)$ é também irreduzível, a primeira alternativa não se verifica. Daí $(3-X) | (1-p^\ell(X))$, isto é, $1-p^\ell(X) = (3-X)g(X)$ para algum $g(X)$. Mas para $X = 3$, segue-se dessa igualdade que $1-2^\ell = 0$, uma contradição pois $\ell \geq 1$. $\square$

PROPOSIÇÃO 9: Seja $\zeta = \sum_{n \geq n_0} \frac{a_n}{X^n}$, $n_0 \in \mathbb{Z}$, um elemento de $K(X)_\infty$. A representação de ζ é periódica se, e somente se, ζ é uma função racional da forma $\frac{f(X)}{X^h(X^\ell-1)}$ onde $f(X)$ é um polinômio, $h \geq r$ e $\ell \geq 1$ são inteiros.

DEMONSTRAÇÃO: Suponhamos que a representação $\zeta = \sum_{n \geq n_0} \frac{a_n}{X^n}$ é periódica. Considere inicialmente $n_0 \geq 0$. Então existem inteiros $h \geq 0$ e $\ell \geq 1$ tais que

$$\zeta = a_0 + \frac{a_1}{X} + \dots + \frac{a_{h-1}}{X^{h-1}} + \frac{a_h}{X^h} + \dots + \frac{a_{h+\ell-1}}{X^{h+\ell-1}} + \frac{a_{h+\ell}}{X^{h+\ell}} + \dots$$

onde $a_{n+\ell} = a_n$ para todo $n \geq h$. Seja $y = \frac{a_h}{X^h} + \dots + \frac{a_{h+\ell-1}}{X^{h+\ell-1}}$. Então

$$\begin{aligned} \zeta &= a_0 + \frac{a_1}{X} + \dots + \frac{a_{h-1}}{X^{h-1}} + y \left(1 + \frac{1}{X^\ell} + \frac{1}{X^{2\ell}} + \dots \right) = \\ &= a_0 + \frac{a_1}{X} + \dots + \frac{a_{h-1}}{X^{h-1}} + \frac{y}{1 - \frac{1}{X^\ell}} \end{aligned}$$

pois a série $1 + \frac{1}{X^\ell} + \frac{1}{X^{2\ell}} + \dots$ converge para $\frac{1}{1 - \frac{1}{X^\ell}}$ na topologia do corpo completo $K(X)_\infty$. Logo

$$\zeta = \frac{g(X)}{X^{h-1}} + \frac{yX^\ell}{X^\ell - 1} = \frac{Xg(X) + yX^{h+\ell}}{X^h(X^\ell - 1)}$$

onde $g(X) = a_0 X^{h-1} + \dots + a_{h-1}$. Assim $\zeta = \frac{f(X)}{X^h(X^\ell - 1)}$ onde $f(X)$ é um polinômio.

Reciprocamente, se ζ é uma função racional da forma $\frac{f(X)}{X^h(X^\ell - 1)}$ onde $f(X)$ é um polinômio e $h \geq 0$ e $\ell \geq 1$ são inteiros, então

$$\zeta = \frac{f(X)}{X^h(X^\ell - 1)} = \frac{f(X)}{X^{h+\ell} \left(1 - \frac{1}{X^\ell}\right)} = \frac{f(X)}{X^{h+\ell}} \left(1 + \frac{1}{X^\ell} + \frac{1}{X^{2\ell}} + \dots\right)$$

e portanto tem representação periódica.

Considere agora $n_0 < 0$. Se $\zeta = \sum_{n \geq n_0} \frac{a_n}{X^n}$ é uma representação periódica, então existem inteiros $h \geq n_0$ e $\ell \geq 1$ tais que $a_{n+\ell} = a_n$ para todo $n \geq h$. Sejam

$$y = \frac{a_h}{X^h} + \dots + \frac{a_{h+\ell-1}}{X^{h+\ell-1}}$$

e $r = -n_0 > 0$. Pelo mesmo argumento anterior

$$\zeta = a_{-r}X^r + \dots + a_{-1}X + \frac{Xg(X) + yX^{h+\ell}}{X^h(X^\ell-1)}.$$

Logo $\zeta = \frac{f(X)}{X^h(X^\ell-1)}$ onde $f(X)$ é um polinômio.

Reciprocamente, a representação no corpo completo $K(X)_\infty$ de uma função racional como acima é periódica.

Observe de novo que nem toda função racional é do tipo descrito acima. Com efeito, considere K um corpo de característica zero e a função racional $\frac{1}{X-2}$. Se $\frac{1}{X-2} = \frac{f(X)}{X^h(X^\ell-1)}$ para algum polinômio $f(X)$ e inteiros h e $\ell \geq 1$. Então $X^h(X^\ell-1) = (X-2)f(X)$. Logo $(X-2) \mid X^h(X^\ell-1)$. Daí $(X-2) \mid X$ ou $(X-2) \mid (X^\ell-1)$. Como a primeira alternativa é impossível, devemos ter $(X^\ell-1) = (X-2)\lambda(X)$ para algum polinômio $\lambda(X)$. Mas para $X = 2$, segue-se dessa igualdade que $2^\ell-1 = 0$, uma contradição, pois $\ell \geq 1$. $\square$

CAPÍTULO III

ESTRUTURA DE CORPOS COMPLETOS A RESPEITO DE VALORIZAÇÕES DISCRETAS.

O Teorema de representação do Capítulo II sugere que deverá haver relações interessantes entre um corpo K completo a respeito de uma valorização discreta v e o corpo de séries formais $\bar{K}((T))$, onde $\bar{K}$ é o corpo de resíduos de (K, v) e T uma indeterminada. Se conseguimos dentro de K um subcorpo S isomorfo a $\bar{K}$, então o próprio S pode ser tomado como um conjunto de representantes de $\bar{K}$ e teremos um isomorfismo natural $\varphi : K \rightarrow \bar{K}((T))$ dado por $\varphi(\sum_{n \geq n_0} s_n \pi^n) = \sum_{n \geq n_0} \bar{s}_n \pi^n$. Observe que se este for o caso, então $\text{caract } K = \text{caract } \bar{K}$. Assim a questão da existência do isomorfismo φ se reduz à escolha de um subcorpo S como sistema de representantes de $\bar{K}$. Este capítulo trata desta questão; o teorema principal afirma que se K e $\bar{K}$ possuem a mesma característica e se $\bar{K}$ é um corpo perfeito, então a especificada escolha é possível e a estrutura de K é bem simples:

TEOREMA 1: *Seja A um anel de valorização discreto com corpo de resíduos $\bar{K}$. Suponha que A e $\bar{K}$ tem a mesma característica e $\bar{K}$ é perfeito. Então A é isomorfo a $\bar{K}[[T]]$.*

Este fato permanece verdadeiro mesmo quando $\bar{K}$ não é perfei-

to. Para a demonstração desse resultado mais tarde, veja por exemplo Cohen [3] e Roquette [11].

DEMONSTRAÇÃO: Pela observação feita inicialmente, basta provar que A contém um conjunto de representantes que é um corpo. Para isso, dividiremos a demonstração em dois casos: primeiro consideraremos K e $\bar{K}$ com características iguais a zero e, em seguida, K e $\bar{K}$ com características iguais a $p \neq 0$.

(i) $\text{car } K = \text{car } \bar{K} = 0$. Neste caso, a existência de um corpo de representantes é verdadeira para anéis locais que são muito mais gerais do que anéis de valorização discretos. O desejado resultado segue da Proposição 1.

(ii) $\text{car } K = \text{car } \bar{K} = p > 0$. Nesse caso o resultado segue da Proposição 3.

PROPOSIÇÃO 1: *Seja A um anel local que é Hausdorff e completo com relação à topologia definida pela sequência decrescente $I_1 \supset I_2 \supset \dots$ de ideais tais que $I_n \cdot I_m \subset I_{n+m}$. Suponha que $\bar{K} = A/I_1$ é um corpo de característica zero. Então A contém um conjunto de representantes de $\bar{K}$ que é um corpo.*

A primeira hipótese sobre A é satisfeita se A é um anel local noetheriano com ideal maximal M e completo na topologia M -ádica.

DEMONSTRAÇÃO DA PROPOSIÇÃO 1: Como $\text{car } K = \text{car } \bar{K} = 0$, o corpo primo de K é isomorfo ao corpo $\mathbb{Q}$ dos racionais e a aplicação $\mathbb{Z} \rightarrow A \rightarrow \bar{K}$ é injetora. Se $x \in \mathbb{Z}$ e $x \neq 0$ então $\bar{x} = x \cdot 1 + I_1 \neq \bar{0}$. Logo $x \cdot 1 \notin I_1$ e portanto é inversível em A . Daí $\mathbb{Q} \subseteq A$. Pelo Lema de Zorn existe um subcorpo $S \subseteq A$ maximal em relação a inclusão. Seja $\bar{S}$ a imagem de S em $\bar{K}$. Vamos provar que $\bar{S} = \bar{K}$. Observe que $\bar{K}$ é extensão algébrica de $\bar{S}$. De fato, seja $\bar{a} \in \bar{K} \setminus \bar{S}$. Considere o anel $S[a] \subseteq A$. Se $S[a] \cap I_1 = (0)$ então $S[a] \subseteq U_A$, conjunto das unidades de A , logo o corpo $S(a) \subseteq A$. Como S é subcorpo maximal de A , tem-se $S(a) = S$, e daí $a \in S$, uma contradição. Assim $S[a] \cap I_1 \neq (0)$. Seja $s_n a^n + \dots + s_0 \neq 0$ com $s_n \neq 0$ um elemento não-nulo de $S[a] \cap I_1$. Então $\bar{s}_n \bar{a}^n + \dots + \bar{s}_0 = \bar{0}$, logo $\bar{a}$ é algébrico sobre $\bar{S}$. Provamos a seguir que $\bar{K} = \bar{S}$. Sejam $\alpha \in \bar{K}$ e $\bar{f}$ o polinômio mínimo de α sobre $\bar{S}$ e levante $\bar{f}$ para $f \in S[x]$. Como $\text{car } \bar{K} = 0$, α é raiz simples de $\bar{f}$. Pela Proposição 2 que segue, existe $x \in A$ tal que $\bar{x} = \alpha$ e $f(x) = 0$. Como $\bar{f}$ é irredutível sobre $\bar{S}$, f é irredutível sobre S e $S[x] \subset A$ é isomorfo a $\bar{S}[\alpha]$ que é um corpo. Então $S \subseteq S(x) \subseteq A$. Pela maximalidade de S , tem-se $S(x) = S$ o que implica $x \in S$ e $\alpha = \bar{x} \in \bar{S}$. Assim $\bar{K} \subseteq \bar{S}$ e consequentemente $\bar{K} = \bar{S}$.

Falta-nos provar a seguinte proposição que é um caso especial do Lema de Hensel:

PROPOSIÇÃO 2: *Seja A como na Proposição 1. Se $f(X) \in A[X]$ é*

tal que $\bar{f}(X) \in \bar{K}[X]$ tem uma raiz simples $\lambda \in \bar{K}$, então f tem uma única raiz $\alpha \in A$ tal que $\bar{\alpha} = \lambda$.

DEMONSTRAÇÃO: Primeiro mostramos a unicidade. Se α é uma tal raiz, temos $f(X) = (X-\alpha)g(X)$ com $\bar{g}(\lambda) \neq 0$. Se α' também é uma raiz com essa propriedade, substituindo X por α' obtemos $0 = (\alpha-\alpha')g(\alpha')$. Como $\overline{g(\alpha')} = \bar{g}(\lambda)$, $g(\alpha')$ é inversível em A . Daí $\alpha' = \alpha$ provando a unicidade. Para provar existência usamos o método de aproximação de Newton. Seja $\alpha_1 \in A$ tal que $\bar{\alpha}_1 = \lambda$; temos $f(\alpha_1) \equiv 0 \pmod{I_1}$. Suponha que existe $\alpha_n \in A$ tal que $\bar{\alpha}_n = \lambda$ e $f(\alpha_n) \equiv 0 \pmod{I_n}$. Vamos mostrar que podemos encontrar $\alpha_{n+1} \in A$ tal que $\alpha_{n+1} \equiv \alpha_n \pmod{I_n}$ e $f(\alpha_{n+1}) \equiv 0 \pmod{I_{n+1}}$. Completaremos a demonstração tomando $\alpha = \lim \alpha_n$. Para encontrar α_{n+1} , escreva $\alpha_{n+1} = \alpha_n + h$ com $h \in I_n$ e aplique a fórmula de Taylor:

$$f(\alpha_{n+1}) = f(\alpha_n) + h f'(\alpha_n) + h^2 y \quad \text{com } y \in A.$$

Tem-se $h^2 y \in I_n$. $I_n \subset I_{2n} \subset I_{n+1}$ e basta encontrar um $h \in I_n$ tal que $f(\alpha_n) + h f'(\alpha_n) \equiv 0 \pmod{I_{n+1}}$. Como λ é raiz simples de $\bar{f}$, temos $\overline{f'(\alpha_n)} = \bar{f}'(\lambda) \neq 0$, logo $f'(\alpha_n)$ é inversível em A . Como $f(\alpha_n) \in I_n$, a congruência acima tem solução; basta tomarmos $h = -f(\alpha_n)/f'(\alpha_n)$.

Consideremos agora

(ii) $\text{car } K = \text{car } \bar{K} = p \neq 0$. Nesse caso o resultado decorre da seguinte proposição:

PROPOSIÇÃO 3: *Sejam K um corpo completo com relação a uma valorização discreta, A o anel de valorização e $\bar{K}$ o seu corpo de resíduos. Suponhamos que $\bar{K}$ é perfeito com $\text{car } \bar{K} = p \neq 0$. Então existem um sistema de representantes S de $\bar{K}$ e uma aplicação injetora $f: \bar{K} \rightarrow S$ tais que*

$$(i) \quad f(\alpha^p) = f(\alpha)^p \quad \forall \alpha \in \bar{K};$$

(ii) *o sistema de representantes S e a aplicação $f: \bar{K} \rightarrow S$ são unicamente determinados por (i);*

$$(iii) \quad SS \subseteq S;$$

$$(iv) \quad 0, 1 \in S.$$

Finalmente, S é um corpo isomorfo a $\bar{K}$ se e somente se $\text{car } K = p$.

DEMONSTRAÇÃO: Seja $\alpha \in \bar{K}$. Como $\bar{K}$ é perfeito, $\alpha^{p^{-1}}, \alpha^{p^{-2}}, \dots, \alpha^{p^{-n}} \in \bar{K}$. Para cada $n \geq 0$ fixamos um representante $a_n \in A$ tal que $\bar{a}_n = \alpha^{p^{-n}}$. Então $\overline{a_n^p} = \alpha$ para todo $n \geq 0$. A sequência $\{a_n^p\}_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy. De fato, $\overline{a_{n+1}^p} = (\alpha^{p^{-(n+1)}})^p = \alpha^{p^{-n}} = \bar{a}_n$. Logo $a_{n+1}^p \equiv a_n^p \pmod{M}$. Daí $a_{n+1}^p = a_n^p + m$ para algum $m \in M$. Assim,

$$a_{n+1}^{p^{n+1}} - a_n^{p^n} = (a_{n+1}^p)^{p^n} - a_n^{p^n} = (a_n^p + m)^{p^n} - a_n^{p^n} = \sum_{i=1}^{p^n} \binom{p^n}{i} m^i a_n^{p^n-i}.$$

Se $i \neq p^n$ então $\binom{p^n}{i} \in M^{p^n} \subseteq M^n$, pois $p \in M$. Se $i = p^n$ então $m^{p^n} \in M^{p^n} \subseteq M^n$. Logo $a_{n+1}^{p^{n+1}} - a_n^{p^n} \in M^n$. Portanto, dado $N > 0$, se

$n > m \geq N+1$ então

$$a_n^{p^n} - a_m^{p^m} = a_n^{p^n} - a_{n-1}^{p^{n-1}} + a_{n-1}^{p^{n-1}} - a_{n-2}^{p^{n-2}} + \dots + a_{m-1}^{p^{m-1}} - a_m^{p^m} \in M^m \subset M^{N+1}.$$

Logo a sequência $\{a_n^{p^n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy. Como K é completo,

existe um elemento $a \in K$ tal que $\lim_{n \in \mathbb{N}} \{a_n^{p^n}\} = a$. Como

$a_n^{p^n} \in A$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e A é fechado em K , temos que $a \in A$.

Para cada $\alpha \in \bar{K}$ escolhamos um a da maneira indicada acima. Va

mos mostrar que a depende apenas de α e não da escolha dos re-

presentantes $a_n \in A$, $n \geq 0$. Se $b_n \in A$ é tal que $\bar{b}_n = \alpha^{p^{-n}}$

para todo $n \geq 0$, então $b_n \equiv a_n \pmod{M}$. Como $\text{car } \bar{K} = p$, o mes

mo argumento acima mostra que $b_n^{p^n} \equiv a_n^{p^n} \pmod{M^{p^n}} \subset M^{n+1}$ pois

$p^n \geq n+1$ para todo $n \geq 0$. Daí $\lim_{n \in \mathbb{N}} \{b_n^{p^n}\} = a$ pois

$a - b_n^{p^n} = a - a_n^{p^n} + a_n^{p^n} - b_n^{p^n}$ e, dado $N > 0$, pela convergência de

$\{a_n^{p^n}\}_{n \in \mathbb{N}}$, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq m$ temos

$a - a_n^{p^n} \in M^{N+1}$. Em particular $a - b_n^{p^n} = a - a_n^{p^n} + a_n^{p^n} - b_n^{p^n} \in M^{N+1}$.

Portanto, para cada $\alpha \in K$ existe um único $a \in A$ obtido da ma-

neira indicada. Seja S o conjunto desses a 's e $f: \bar{K} \rightarrow S$ de-

finida por $f(\alpha) = a$. Se $a, b \in S$ então existem α e $\beta \in \bar{K}$ tais

que a e b representam α e β , respectivamente, isto é, $a =$

$= \lim_{n \in \mathbb{N}} \{a_n^{p^n}\}$ com $\bar{a}_n = \alpha^{p^{-n}}$ e $b = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{b_n^{p^n}\}$ com

$\bar{b}_n = \beta^{p^{-n}}$. É claro que $\overline{a_n b_n} = (\alpha\beta)^{p^{-n}}$ e

$$ab = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{a_n^{p^n}\} \cdot \lim_{n \in \mathbb{N}} \{b_n^{p^n}\} = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{(a_n b_n)^{p^n}\}.$$

Se $\alpha, \beta \in \bar{K}$ e $f(\alpha) = a$, $f(\beta) = b$ então

$$f(\alpha) \cdot f(\beta) = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{a_n^{p^n}\} \lim_{n \in \mathbb{N}} \{b_n^{p^n}\} = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{(a_n b_n)^{p^n}\} = f(\alpha\beta).$$

Logo $f(\alpha^P) = f(\alpha)^P$. Isto prova (iii). Para (iv), como $\bar{0}$ e $\bar{1}$ estão em $\bar{K}$, basta tomarmos $a_n = 0$ e $b_n = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e tem-se $0 = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{a_n^{p^n}\}$ e $1 = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{b_n^{p^n}\}$ em S . Prova mos a seguir (i): $S^P = S$. A inclusão $S^P \subseteq S$ é evidente. Suponha agora que $a = f(\alpha) \in S$ com $\alpha \in \bar{K}$. Como $\bar{K}$ é perfeito, existe $\beta \in \bar{K}$ tal que $\beta^P = \alpha$. Seja $f(\beta) = b$. Assim $f(\beta^P) = f(\beta)^P = b^P$. Por outro lado $f(\beta^P) = f(\alpha) = a$ e portanto $b^P = a$, donde $S \subseteq S^P$ e temos $S^P = S$.

(ii): Suponhamos que S' é um outro sistema de representantes e $g: \bar{K} \rightarrow S'$ uma função tal que $g(\alpha^P) = g(\alpha)^P \forall \alpha \in \bar{K}$. Sejam $g(\alpha) = b_0$ e $g(\alpha^{p^{-n}}) = b_n \in S'$. Então

$$g(\alpha) = g((\alpha^{p^{-n}})^{p^n}) = g(\alpha^{p^{-n}})^{p^n} = b_n^{p^n} \in S'.$$

Como g é função $b_0 = b_n^{p^n}$. Observe que a sequência $\{b_n^{p^n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ define o limite $a = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{b_n^{p^n}\}$, $a \in S$. Como $b_n^{p^n} = b_0 \in S'$, tem-se $a = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{b_n^{p^n}\} = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{b_0\} = b_0$ e segue-se $S' \subseteq S$. Ora,

$S \subseteq S'$, pois cada $a \in S$ é da forma $a = f(\alpha)$ para algum $\alpha \in \bar{K}$.

Além disso, $g(\alpha) = b_0$. Mas $f(\alpha) = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{a_n^{p^n}\} = a$ e $g(\alpha) = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{b_n^{p^n}\} = b_0$. Como $a_n^{p^n} = b_n^{p^n} = \alpha$, $a = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{a_n^{p^n}\} = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{b_n^{p^n}\} = b_0$, $a \in S'$. Portanto $S' = S$ e $g = f$.

Finalmente, se $\text{car } K = p \neq 0$ então S é um corpo isomorfo a $\bar{K}$. De fato, se a e $b \in S$ então $a = f(\alpha)$ e $b = f(\beta)$ e digamos $a = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{a_n^{p^n}\}$ e $b = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{b_n^{p^n}\}$. Então

$$a+b = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{a_n^{p^n}\} + \lim_{n \in \mathbb{N}} \{b_n^{p^n}\} = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{(a_n + b_n)^{p^n}\} = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{c_n^{p^n}\}$$

onde $c_n = a_n + b_n$. Como $\bar{a}_n = \alpha^{p^{-n}}$ e $\bar{b}_n = \beta^{p^{-n}}$, $\bar{a}_n + \bar{b}_n = (\alpha + \beta)^{p^{-n}}$. Logo $a+b = f(\alpha + \beta) \in S$. Assim a função f é isomorfismo de corpos e S é um corpo de representantes. Reciprocamente, se $\text{car } K = 0$ então S não pode ser fechado sob adição; se assim o fosse, como $1 \in S$, teríamos $1 + \dots + 1 \in S$. Logo $p \in S$. Observe que $0 \in S$.

p vezes

Mas $\bar{p} = \bar{0} \in \bar{K}$ e como S é um sistema de representantes de $\bar{K}$, $p = 0$ em S , em contradição a $\text{car } K = 0$.

CAPÍTULO IV

O FECHO ALGÉBRICO DO CORPO DE SÉRIES FORMAIS $k((T))$

Este capítulo trata de um dos principais resultados desta tese, a saber a descrição do fecho algébrico do corpo de séries formais $k((T))$ sobre um corpo k fechado algebricamente de característica 0. Como apontamos mais adiante existem pelo menos três demonstrações tratando desta descrição e neste capítulo desenvolvemos duas delas. Estas provas usam a teoria de ramificação de valorizações. A descrição ora em questão inclui o seguinte resultado: Se k é um corpo algebricamente fechado de característica 0, então qualquer extensão algébrica finita do corpo de séries formais $k((T))$ é também um corpo de séries formais.

Consideraremos neste capítulo as seguintes notações e hipóteses: K denotará um corpo completo com relação a uma valorização discreta v_K ; o anel de valorização correspondente será denotado por A_K , seu ideal maximal M_K , seu corpo de resíduos $\bar{K} = A_K/M_K$ e $U_K = A_K \setminus M_K$ o grupo de unidades de A_K .

Se L é uma extensão finita separável de K , denotaremos por A_L o fecho integral de A_K em L . Pelos resultados citados no Capítulo 1, A_L é um anel de valorização discreto completo e é o único anel de valorização de L que estende A_K . A restrição a K de qualquer valorização w de L correspondente a A_L é equi-

valente apenas a v_L . É possível mostrar então que podemos escolher $w = v_L$ de modo que $v_L/K = v_K$ e nesse caso, o grupo de valores Γ de v_L contém o grupo de valores Δ de v_K , e depois de uma identificação natural o corpo de resíduos $\bar{L}$ de v_L contém o corpo de resíduos $\bar{K}$ de v_K . Feito isso, definimos v_L , M_L e U_L como acima e vamos supor que a extensão residual $\bar{L}/\bar{K}$ seja separável.

A fim de caracterizarmos o fecho algébrico do corpo de séries formais $K = k((T))$ onde k é um corpo algebricamente fechado de característica zero, desenvolveremos a seguir um breve estudo sobre grupos de ramificação e algumas de suas propriedades. Devemos observar porém que esta não é a única maneira de fazê-lo. Existem outras demonstrações como por exemplo a que é dada por R.J. Walker em seu livro Algebraic Curves que usa o polígono de Newton e argumentos mais elementares do que aqueles que usaremos aqui. Daremos no final deste capítulo ainda uma terceira demonstração mais elementar.

Seja L/K uma extensão galoisiana satisfazendo às hipóteses acima e seja $G = G(L/K)$ o seu grupo de Galois. Note que se $s \in G$, então v_L e $v_L \circ s$ são valorizações de L estendendo v_K e pela unicidade da extensão segue que $v_L = v_L \circ s$. Daí, $s(A_L) = A_L$ e $s(M_L^i) = M_L^i \quad \forall i \geq 0$. Assim s opera sobre A_L/M_L^i com A_K/M_K^i linear e a aplicação de $G \times A_L$ em A_L que a cada par (s, y) associa o elemento $s(y)$ define uma ação do grupo G sobre o anel A_L . Além disso, pelo teorema 4 do Capítulo 1, existe um elemento

x em A_L tal que as potências $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ formam uma base de A_L sobre A_K .

LEMA 1: *Sejam $s \in G$ e i um inteiro ≥ -1 . Então são equivalentes as seguintes condições:*

- a) *s opera trivialmente no anel quociente A_L/M_L^{i+1} ;*
- b) *$v_L(s(a)-a) \geq i+1$ para todo $a \in A_L$;*
- c) *$v_L(s(x)-x) \geq i+1$*

DEMONSTRAÇÃO: A aplicação que a cada par $(s, \bar{a})$ de $G \times A_L/M_L^{i+1}$ associa o elemento $\overline{s(a)}$ de A_L/M_L^{i+1} define uma ação do grupo G sobre o anel quociente. Dizemos que um elemento s de G opera trivialmente sobre A_L/M_L^{i+1} se $\overline{s(a)} = \bar{a}$ ou seja $s(a)-a \in M_L^{i+1}$. Assim (a) $\Leftrightarrow$ (b) é imediato. Mostremos agora que (a) $\Leftrightarrow$ (c). Como $1, x, \dots, x^{n-1}$ constitui uma base de A_L sobre A_K , $\bar{1}, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{n-1}$ constitui um conjunto de geradores de A_L/M_L^{i+1} sobre A_K . Daí s opera trivialmente sobre A_L/M_L^{i+1} se e somente se $s(x^j)-x^j \in M_L^{i+1}$ para todo $j = 0, 1, 2, \dots, n-1$. Mas para todo $j \geq 2$, $s(x)-x$ divide $s(x^j)-x^j$. Logo s opera trivialmente sobre A_L/M_L^{i+1} se e somente se $s(x)-x \in M_L^{i+1}$ ou seja $v_L(s(x)-x) \geq i+1$. Portanto (a) $\Leftrightarrow$ (c).

Para cada $i \geq 1$, seja G_i o conjunto dos $s \in G$ que satisfazem às condições do Lema 1.

PROPOSIÇÃO 1: *Os G_i formam uma sequência decrescente de subgru*

pos normais de $G:G_{-1} = G$, G_0 é o subgrupo de inércia de G e $G_i = \{1\}$ para i suficientemente grande.

DEMONSTRAÇÃO: Sendo L/K uma extensão finita, G é um grupo finito. G_i é subconjunto não vazio de G pois a identidade I está em G_i . Sejam s e $t \in G_i$. Então para qualquer a em A_L , $s(a)-a$ e $t(a)-a$ estão em M_L^{i+1} . Ora, $(s \circ t)(a)-a = s(t(a)-a) + s(a)-a \in s(M_L^{i+1}) + M_L^{i+1} = M_L^{i+1} + M_L^{i+1} \subseteq M_L^{i+1}$, donde $st(a)-a \in M_L^{i+1}$. Daí G_i é fechado em relação à operação de G e é portanto um subgrupo de G . Se s é um elemento qualquer de G_{i+1} então $s(a)-a$ está em M_L^{i+2} para todo a em A_L , isto é, $v_L(s(a)-a) \geq i+2 \geq i+1$. Logo $s \in G_i$. Assim, os G_i formam uma seqüência decrescente de subgrupos de G . Além disso, cada G_i é normal em G . De fato, sejam $s \in G$, $t \in G_i$ e $a \in A_L$ elementos quaisquer. Então $\overline{sts^{-1}(a)} = \overline{st(s^{-1}(a))}$. Como t opera trivialmente no anel quociente A_L/M_L^{i+1} , $\overline{st(s^{-1}(a))} = \overline{s(s^{-1}(a))} = \overline{s(s^{-1}(a))} = \overline{\bar{a}}$, ou seja, $\overline{sts^{-1}(a)} = \overline{\bar{a}}$ donde $\overline{sts^{-1}(a)-a} \in M_L^{i+1}$, logo $sts^{-1} \in G_i$.

Sejam $s \in G$ e $a \in A_L$. Então $v_L(a) \geq 0$ e, como $s(a) \in A_L$, $v_L(s(a)) \geq 0$. Assim $v_L(s(a)-a) \geq \min \{v_L(s(a)), v_L(a)\} \geq 0$, o que coloca $s(a)-a$ em A_L . Logo $s \in G_{-1}$ e temos $G \subseteq G_{-1}$. Como $G_{-1} \subseteq G$ segue-se a igualdade $G_{-1} = G$.

Provemos agora que G_0 é o subgrupo de inércia de G . Seja $D = \{s \in G; s(M_L) = M_L\}$. Então, como vimos anteriormente, $D = G$. Logo o grupo de inércia de G é o núcleo do homomorfismo

$$\begin{aligned} \varepsilon : G \rightarrow G(\bar{L}/\bar{K}) \quad \text{onde} \quad \varepsilon(s) : \bar{L} \rightarrow \bar{L} \\ s \mapsto \varepsilon(s) \quad \quad \quad \bar{x} \mapsto \overline{s(x)} \end{aligned}$$

O núcleo de ε é $\ker \varepsilon = \{s \in G; \varepsilon(s) = I_{\bar{L}}\}$. Mas $\varepsilon(s) = I_{\bar{L}}$ se, e somente se, para todo $a \in A_{\bar{L}}$ tivermos $\varepsilon(s)(\bar{a}) = \bar{a}$. Como $\varepsilon(s)(\bar{a}) = \overline{s(a)}$, isso equivale a $s(a) - a \in M_{\bar{L}}$. Portanto $\ker \varepsilon = G_0$.

Finalmente, seja $\lambda \geq \sup \{v_L(s(x) - x); s \neq 1\}$. Se $s \in G_\lambda$, pela condição (2) do Lema 1, $v_L(s(x) - x) \geq \lambda + 1$, logo $s(x) - x = 0$, daí $s(x) = x$, isto é, $s = 1$ e segue-se $G_\lambda = \{1\}$. $\square$

O grupo G_i é chamado *i-ésimo grupo de ramificação de G* (ou de L/K).

PROPOSIÇÃO 2: *Seja i um inteiro não negativo. Para que um elemento s do grupo de inércia de G_0 pertença a G_i é necessário e suficiente que $\frac{s(\pi)}{\pi} \equiv 1 \pmod{M_L^i}$ onde π é um elemento primo de A_L .*

DEMONSTRAÇÃO: Como desejamos informação sobre elementos de G_0 , pode-se substituir G por G_0 e K por K_r , o corpo fixo de G_0 , o qual corresponde à maior extensão não-ramificada de K . Como por hipótese $\bar{L}/\bar{K}$ é separável, então L/K_r é uma extensão totalmente ramificada. Pela Proposição 4 Capítulo I, $A_L = A_{K_r}[\pi]$. Portanto $\frac{s(\pi)}{\pi} \equiv 1 \pmod{M_L^i}$ se, e somente se $v_L\left(\frac{s(\pi)}{\pi} - 1\right) \geq i \Leftrightarrow 1 + v_L\left(\frac{s(\pi)}{\pi} - 1\right) \geq i+1 \Leftrightarrow v_L(\pi) + v_L\left(\frac{s(\pi)}{\pi} - 1\right) = v(s(\pi) - \pi) \geq i+1$, se e somente se,

pelo item (3) do Lema 1, $s \in G_i$.

Definimos agora $U_L^{(0)} = U_L$ e $U_L^{(i)} = 1 + M_L^i$ para $i \geq 1$. Isso nos dá uma sequência decrescente de subgrupos fechados de U_L ; esses subgrupos formam uma base de vizinhanças de 1 com relação à topologia induzida sobre U_L pela topologia de valorização de L^* . Como U_L é fechado, consequentemente completo, temos $U_L = \lim_{\leftarrow} U_L/U_L^{(i)}$.

Por simplicidade escreveremos U_L^i em vez de $U_L^{(i)}$, pois não há como confundir com potências de elementos de U_L .

PROPOSIÇÃO 3: (a) U_L^0/U_L^1 é canonicamente isomorfo ao grupo multiplicativo $\bar{L}^*$ do corpo de resíduos $\bar{L}$.

(b) Para $i \geq 1$, U_L^i/U_L^{i+1} é canonicamente isomorfo a M_L^i/M_L^{i+1} que, por sua vez, é isomorfo não canonicamente ao grupo aditivo do corpo de resíduos $\bar{L}$.

DEMONSTRAÇÃO: (a) Seja φ a aplicação que a cada u de U_L associa o elemento $u+M_L$ em $\bar{L}^*$. É evidente que φ é homomorfismo sobrejetor de grupos. Além disso se u está no núcleo $\ker \varphi$ de φ então $\varphi(u) = 1+M_L$. Como $\varphi(u) = u+M_L$, $1+M_L = u+M_L$ o que implica $u \in 1+M_L$, daí $\ker \varphi \subseteq 1+M_L$. Por outro lado, para todo b em M_L , $1+b$ está em U_L ; assim $\varphi(1+b) = 1+b+M_L = 1+M_L$, logo $1+M_L \subseteq \ker \varphi$. Das duas inclusões segue-se que $\ker \varphi = 1+M_L$ e, pelo teorema de isomorfismo, $U_L^0/U_L^1 \cong \bar{L}^*$.

(b) Para $i \geq 1$, seja $\psi : M_L^i \rightarrow U_L^i/U_L^{i+1}$ definida por $\psi(x) = \overline{1+x}$. Então $\psi(x+y) = \overline{1+x+y}$ enquanto que $\psi(x)\psi(y) = \overline{1+x+y+xy}$. Como $1+x+y+xy = (1+x+y) \left(1 + \frac{xy}{1+x+y}\right)$ e $1 + \frac{xy}{1+x+y} \in U_L^{i+1}$ (pois $xy \in M_L^{2i} \subset M_L^{i+1}$, $1+x+y \in U_L$ e M_L^{i+1} sendo um ideal de A_L , $\frac{xy}{1+x+y} \in M_L^{i+1}$). Assim $1+x+y+xy = (1+x+y) \text{ mod } U_L^{i+1}$. Portanto ψ é um homomorfismo. ψ é evidentemente sobrejetor e seu núcleo $\ker \psi = \{x \in M_L^i / \overline{1+x} = \bar{1}\}$. Mas $\overline{1+x} = \bar{1}$ se, e somente se, $1+x \in U_L^{i+1}$, isto é, $x \in M_L^{i+1}$. Passando ao quociente temos $M_L^i/M_L^{i+1} = U_L^i/U_L^{i+1}$. Para mostrarmos que M_L^i/M_L^{i+1} é isomorfo ao grupo aditivo de $\bar{L}$, basta verificar que M_L^i/M_L^{i+1} é um espaço vetorial unidimensional sobre $\bar{L}$. De fato, se $\alpha = \pi^i + \pi^{i+1}A_L = \pi^i + M_L^{i+1}$, qualquer elemento x de M_L^i/M_L^{i+1} pode ser escrito como $c\alpha$ onde c é um elemento de $\bar{L}$. Daí a aplicação que a cada $x \in M_L^i/M_L^{i+1}$ associa $c \in \bar{L}$ tal que $x = c\alpha$ é isomorfismo. $\square$

Vamos agora, utilizando a Proposição 4 a seguir, estabelecer a relação entre G_i/G_{i+1} e U_L^i/U_L^{i+1} reescrevendo a Proposição 2 como $s \in G_i$ se, e somente se, $\frac{s(\pi)}{\pi} \in U_L^i$. Além disso, essa proposição e seus corolários nos deixarão mais perto da caracterização que buscamos.

PROPOSIÇÃO 4: A aplicação que a cada $s \in G_i$ associa $\frac{s(\pi)}{\pi}$ induz por passagem ao quociente um isomorfismo θ_i do grupo quociente G_i/G_{i+1} num subgrupo do grupo U_L^i/U_L^{i+1} . Esse isomorfismo não depende da escolha do elemento primo π .

Explicitamente, se $s \in G_0$, então $s\pi = u\pi$ com $u \in U_L$, e $\theta_0(s) = \bar{u} \in \bar{L}^*$. Se $s \in G_i$, $i \geq 1$ então $s\pi = \pi(1+a)$ com $a \in M_L^i$, e $\theta_i(s)$ é igual à classe a em M_L^i/M_L^{i+1} .

DEMONSTRAÇÃO: Seja $\varphi : G_i \rightarrow U_L^i/U_L^{i+1}$ definido por $s \mapsto \overline{\left(\frac{s(\pi)}{\pi}\right)}$. φ é um homomorfismo de grupos. Com efeito, $\varphi(st) = \overline{\left(\frac{st(\pi)}{\pi}\right)}$ e $\varphi(s)\varphi(t) = \overline{\left(\frac{s(\pi)}{\pi}\right)} \overline{\left(\frac{t(\pi)}{\pi}\right)}$. Como $\frac{st(\pi)}{\pi} = \frac{s(\pi)}{\pi} \frac{t(\pi)}{\pi} \frac{s(u)}{u}$ onde $u = \frac{t(\pi)}{\pi} \in U_L^i$. Se $s \in G_i$ então $v_L(s(u)-u) \geq i+1$. Logo $s(u)-u = m \in M_L^{i+1}$ o que implica $\frac{s(u)}{u} - 1 = m \cdot \frac{1}{u} \in M_L^{i+1}$ e tem-se $\frac{s(u)}{u} = 1 + m \cdot \frac{1}{u} \in U_L^{i+1}$. Daí $\frac{st(\pi)}{\pi} \equiv \frac{s(\pi)}{\pi} \frac{t(\pi)}{\pi} \pmod{U_L^{i+1}}$. Portanto $\varphi(st) = \varphi(s)\varphi(t)$. $\ker \varphi = \{s \in G_i; \overline{\left(\frac{s(\pi)}{\pi}\right)} = \bar{1}\} = \{s \in G_i; \frac{s(\pi)}{\pi} \in U_L^{i+1}\} = G_{i+1}$. Pelo Teorema de Isomorfismo G_i/G_{i+1} é isomorfo a um subgrupo U_L^i/U_L^{i+1} .

Se π' é outro elemento primo de A_L então $\pi' = \pi u$ com $u \in U_L$. Logo $\frac{s(\pi')}{\pi'} = \frac{s(\pi u)}{\pi u} = \frac{s(\pi)}{\pi} \cdot \frac{s(u)}{u}$. Como $\frac{s(u)}{u} \equiv 1 \pmod{U_L^{i+1}}$, $\frac{s(\pi')}{\pi'} \equiv \frac{s(\pi)}{\pi} \pmod{U_L^{i+1}}$. Portanto θ_i independe da escolha do elemento primo π . $\square$

COROLÁRIO 1: O grupo G_0/G_1 é cíclico e é levado isomorficamente por θ_0 num subgrupo do grupo das raízes da unidade contidas em $\bar{L}$. Sua ordem é prima com a característica do corpo $\bar{L}$.

DEMONSTRAÇÃO: Como $U_L^0/U_L^1 = \bar{L}^*$ (identificando os elementos de

U_L^0/U_L^1 através do isomorfismo na Proposição 3) e L/K é extensão finita, $\theta_0(G_0/G_1)$ é subgrupo finito de $\bar{L}^*$. Se n é a ordem de $\theta_0(G_0/G_1)$ então qualquer que seja $s \in G_0$, $\theta_0(\bar{s})^n = 1$, isto é, $\theta_0(\bar{s})$ é raiz do polinômio $X^n - 1$, portanto uma raiz n -ésima da unidade. Assim $\theta_0(G_0/G_1)$ é um subgrupo do grupo das raízes n -ésimas da unidade contidas em $\bar{L}$ e, portanto, é cíclico. Seja p a característica de $\bar{L}$. Se p divide n , então $n = pm$. Logo $x^n - 1 = (x^m - 1)^p = 0$ implica $x^m - 1 = 0$ para qualquer x em $\theta_0(G_0/G_1)$, o que é absurdo pois $m < n$. $\square$

COROLÁRIO 2: *Se a característica de $\bar{L}$ é zero, então $G_1 = \{1\}$ e o grupo G_0 é cíclico.*

DEMONSTRAÇÃO: Se $i \geq 1$, U_L^i/U_L^{i+1} é isomorfo ao grupo aditivo de $\bar{L}$ que não tem subgrupos finitos não-triviais. Logo $G_i = G_{i+1}$ e, como $G_i = \{1\}$ para i suficientemente grande, temos que $G_1 = \{1\}$ e $G_0 = G_0/G_1$ é cíclico pelo Corolário 1. $\square$

Agora, usando o Corolário 2, caracterizaremos o fecho algébrico do corpo de séries formais $k((T))$.

TEOREMA 5: *Seja k um corpo algebricamente fechado de característica zero e seja $K = k((T))$. Então o fecho algébrico K_a do corpo K é a união dos corpos $F_n = k((T^{1/n}))$ para $n \geq 1$.*

DEMONSTRAÇÃO: Seja L uma extensão galoisiana finita de K de

grau n e G o seu grupo de Galois. Como $\bar{K} = k$, algebricamente fechado, $G = G_0$. Pelo Corolário 2, G_0 é cíclico. Seja L' uma outra extensão galoisiana finita de K cujo grau é n . Como a extensão composta $L'L$ é galoisiana finita, $L'L/K$ é extensão cíclica. Assim $\text{Gal}(L'L/K)$ que é cíclico, possui apenas um subgrupo de índice n . Logo $\text{Gal}(L'/K) = \text{Gal}(L/K)$ e $L = L'$. Isto mostra que para cada número natural n existe uma única extensão de K de grau n .

$T^{\frac{1}{n}}$ é raiz do polinômio $X^n - T$. Como $k[[T]]$ é anel fatorial, o polinômio $X^n - T$ é irredutível por Eisenstein. Para cada n temos portanto uma extensão $K(T^{\frac{1}{n}})$ de K de grau n .

Sejam $L_n = K(T^{\frac{1}{n}})$ e $K_n = k((T^{\frac{1}{n}}))$. Vamos provar que $L_n = K_n$; isto é, L_n é também um corpo de séries formais. Como L_n é completo, $\bar{L}_n = k$ e por hipótese $\text{car } k = 0$. Logo $\bar{K} = k \subset L_n$ é um corpo de representantes de $\bar{L}_n$. Como $f = [\bar{L}:\bar{K}] = 1$ pois $\bar{L} = \bar{K} = k$, temos $n = [L_n:K] = ef = e$. Seja π_K em elemento primo de K . Então $v_L(\pi_K) = e v_K(\pi_K) = e \cdot 1 = n$. Tomemos $T = \pi_K$. Assim

$$v_L(T^{\frac{1}{n}}) = \frac{1}{n} v_L(T) = \frac{1}{n} v_L(\pi_K) = \frac{1}{n} \cdot n = 1$$

e $T^{\frac{1}{n}}$ é um elemento primo de L_n . Aplicando o Teorema 1 do Capítulo 2 concluímos $L_n = k((T^{\frac{1}{n}}))$. Portanto, $K_a = \bigcup_n L_n = \bigcup_n K_n$. $\square$

Desse modo, cada extensão finita de K de grau n tem o gru-

po cíclico $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ como grupo de Galois. Como $G(K_a/K) = \varprojlim G(L/K)$, onde L percorre o conjunto de extensões galoisianas finitas de K , $G(K_a/K) = \varprojlim \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \hat{\mathbb{Z}}$.

COROLÁRIO: O grupo de Galois $G(K_a/K)$ é $\hat{\mathbb{Z}}$.

Dissemos no início deste Capítulo que a maneira de caracterizar o fecho algébrico de $K = k((T))$ via grupos de ramificação não é a única e citamos a demonstração de Walker usando polígonos de Newton e valorizações. A proposição que mostraremos a seguir nos dá um terceiro caminho para se obter o fecho algébrico K_a de $K = k((T))$ diferente daqueles já mencionados, com uma vantagem: a de podermos analisar situações mais gerais, a saber, quando k não é de característica zero ou não é algebricamente fechado.

PROPOSIÇÃO 6: Suponha que L/K é totalmente ramificada, $[L:K] = e$ e $\text{car } \bar{K} = 0$ ou $\text{car } \bar{K}$ não divide e . Então $L = K(\sqrt[e]{\pi})$ onde π é um elemento primo de K .

DEMONSTRAÇÃO: Observemos inicialmente que se $v' = v_L/K$ então $v' = \alpha v_K$ para algum real $\alpha > 0$. Se $\pi \in K$ é tal que $v_K(\pi) = 1$ então $v'(\pi) = \alpha \in v'(K^*)$. Logo $e = (v_L(L^*) : v'(K^*)) = (Z : \alpha Z) = \alpha$, em K ; assim temos $v_L = e v_K$.

Seja π_L um elemento primo de A_L . Pela observação acima $\pi_L^e = \pi_K \mu$ onde μ é uma unidade de A_L . Como $\bar{L} = \bar{K}$, existe u ,

unidade de A_K , tal que $\mu-u \in \pi_L A_L$. Escrevamos agora $\pi_L^e = \pi_K u + \pi_K(\mu-u)$. Tomemos $f(X) = X^e - \pi_K u \in L[X]$. Sejam $\alpha, \zeta\alpha, \dots, \zeta^{e-1}\alpha$ as raízes de f onde ζ é raiz primitiva e -ésima da unidade no fecho algébrico. Se w é a extensão da valorização v_L a um fecho algébrico de L , então, para todo $i \notin \{0, e\}$, $w(\zeta^i \alpha - \alpha) = w[\alpha(\zeta^i - 1)] = w(\alpha) + w(\zeta^i - 1)$. Por hipótese, $\text{car } \bar{K}$ não divide e , logo X^{e-1} tem raízes distintas $\zeta^0, \zeta^1, \dots, \zeta^{e-1}$ tanto no fecho algébrico de K quanto no fecho algébrico de $\bar{K}$. Portanto $w(\zeta^i - 1) = 0$ e segue-se $w(\zeta^i \alpha - \alpha) = w(\alpha)$.

Como $\pi_L^e = \pi_K u + \pi_K(\mu-u)$ tem-se $f(\pi_L) = \pi_L^e - \pi_K u = \pi_K(\mu-u)$. Como $f(X) = \prod_{i=0}^{e-1} (X - \zeta^i \alpha)$, $f(\pi_L) = \prod_{i=0}^{e-1} (\pi_L - \zeta^i \alpha)$. Aplicando w a ambos os membros dessa igualdade, e considerando a igualdade anterior, obtemos

$$\begin{aligned} w[f(\pi_L)] &= \sum_{i=0}^{e-1} w(\pi_L - \zeta^i \alpha) = w[\pi_K(\mu-u)] = \\ &= w(\pi_K) + w(\mu-u) > w(\pi_K) \end{aligned}$$

pois $w(\mu-u) > 0$. Assim, $\sum_{i=0}^{e-1} w(\pi_L - \zeta^i \alpha) > w(\pi_K u) = w(\alpha^e) = ew(\alpha)$, donde existe j , $0 \leq j < e$ tal que

$$w(\pi_L - \zeta^j \alpha) > w(\alpha) = \max \{w(\zeta^i \alpha - \alpha); \quad 0 < i \leq e-1\}.$$

Sendo L henseliano, pelo Lema de Krasner, Capítulo 1, $L(\zeta^j \alpha) \subset L(\pi_L) = L$. Mas $\zeta^j \alpha \in L(\zeta^j \alpha)$, logo $\zeta^j \alpha \in L$. Como f é um polinômio de Eisenstein, f é irredutível e $[K(\zeta^j \alpha) : K] = e$. Note que

$K \subset K(\zeta^j \alpha) \subset L$ e, como $[L:K] = e = \partial f$, temos $K(\zeta^j \alpha) = L$. Se
ja pois, $\pi = \pi_K u$. Assim $L = K(\sqrt[e]{\pi})$. $\square$

Analisaremos agora, à luz da Proposição 6, o fecho algébrico do corpo de séries formais $K = k((T))$ onde k é um corpo algebricamente fechado e se característica zero. K é henseliano, logo para cada extensão finita L de K existe um único anel de valorização de L que estende o de K . Como $\bar{L} = \bar{K} = k$, $f = [\bar{L}:\bar{K}] = 1$ e temos verificadas as hipóteses da Proposição 6. Portanto $L = K(\sqrt[e]{\pi})$ onde π é um elemento primo de K . Sendo k algebricamente fechado, k contém as raízes e -ésimas primitivas da unidade de e , conseqüentemente, K também as contém. Sendo $\text{car } K = 0$ segue que $K(\alpha)/K$ onde $\alpha = \sqrt[e]{\pi}$ é extensão cíclica. Se σ é um K -automorfismo de $K(\alpha)$ então $\sigma\alpha$ é também uma raiz de $X^e - \pi$. Logo $\sigma\alpha = \zeta^{i(\sigma)} \alpha$ onde $\zeta^{i(\sigma)}$ é uma raiz e -ésima da unidade, não necessariamente primitiva. A aplicação $\sigma \mapsto \zeta^{i(\sigma)}$ é obviamente um homomorfismo injetor de $G = G(K(\alpha)/K)$ num subgrupo do grupo cíclico das raízes e -ésimas da unidade. Como $\#G = [K(\alpha):K] = e$, a aplicação acima é sobre, portanto um isomorfismo. Daí $G \cong \mathbb{Z}/e\mathbb{Z}$.

Suponha agora $K(\sqrt[e]{T})$ é também uma extensão de K de grau e . Como a extensão composta $K(\sqrt[e]{T}) K(\sqrt[e]{\pi})/K$ é finita, portanto cíclica, pelo que mostramos anteriormente, para cada divisor n da ordem do grupo de Galois dessa extensão, existe um único subgrupo de ordem n . Pelo Teorema Fundamental da Teoria de Galois existe um único subcorpo intermediário cujo grau sobre K é

e. Daí $K(\sqrt[e]{T}) = K(\sqrt[e]{\pi})$. Provamos que para cada inteiro positivo e existe uma única extensão de K de grau e . Assim, se K_a é o fecho algébrico de K então $K_a = \bigcup_e K(\sqrt[e]{T}) = \bigcup_e k((T^{\frac{1}{e}}))$, onde a última igualdade foi obtida na demonstração da Proposição 5.

Como apontamos na Introdução deste Capítulo, segue da prova do Teorema 5 o seguinte resultado interessante: Se k é um corpo algebricamente fechado de característica 0, então uma extensão finita do corpo de séries formais $k((T))$ é também um corpo de séries formais.

CAPÍTULO V

MÓDULOS FINITAMENTE GERADOS SOBRE O ANEL DE POLINÔMIOS $k[X]$ SENDO k UM CORPO

Neste capítulo desenvolvemos a estrutura de um módulo finitamente gerado sobre o anel de polinômios $k[X]$, onde k é um corpo. Pode parecer um pouco estranho incluí-lo numa tese de mestrado, já que ele faz parte de um curso comum de álgebra; aliás de muitos livros inclusive [5] e [12], fornecem um resultado ainda mais geral do que o nosso, dando assim a estrutura de módulos finitamente gerados sobre domínios principais.

Nossa abordagem via anel de polinômios $k[X]$ tem a finalidade de orientar a prova do teorema principal desta tese que consta do próximo capítulo. Este teorema trata da estrutura de módulos finitamente gerados sobre o anel de séries formais $\mathbb{Z}_p[[X]]$ onde $\mathbb{Z}_p$ é o anel de inteiros p -ádicos, sendo p um número primo.

A prova é via matrizes de relações e um componente principal da prova é o Teorema de Preparação de Weierstrass proporcionando o análogo para o anel $\mathbb{Z}_p[[X]]$ da divisão euclideana no caso do anel $k[X]$. Assim achamos interessante desenvolver uma prova da estrutura de módulos finitamente gerados sobre o anel de polinômios $k[X]$ via uma abordagem matricial.

Cabe mencionar que de modo geral esta abordagem não é de praxe nos livros comuns de álgebra. Nossa prova é tirada do livro de

Mal'cev [8]. É evidente que nossa abordagem é mais interessante do ponto de vista da álgebra linear nos estudos de formas canônicas de uma transformação linear T sobre um espaço vetorial de dimensão finita sobre o corpo k . Assim o presente capítulo torna-se mais didático e interessante.

Seja M um módulo finitamente gerado sobre o anel de polinômios $k[X]$, onde k é um corpo. Suponha que M é gerado por n elementos $u_1, \dots, u_n$. Então existe um homomorfismo sobrejetor θ do $k[X]$ -módulo livre $k[X]^n$ em M , tal que $\theta(y_i) = u_i$ para todo $i = 1, \dots, n$, onde $y_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $y_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots$ e $y_n = (0, \dots, 0, 1)$. Se $K = \ker \theta$ então, pelo Teorema Fundamental do Isomorfismo, $M \simeq k[X]^n/K$.

PROPOSIÇÃO 1: *O submódulo K pode ser gerado por m elementos com $m \leq n$.*

DEMONSTRAÇÃO: Seja $R = k[X]$. Procedemos por indução sobre n . Como K é um submódulo de R^n , temos que

$$I_1(K) = \{a \in R / \exists y \in K \text{ tal que } y - ay_1 \in Ry_2 + \dots + Ry_n\}$$

é um ideal de R . Sendo R um domínio de ideais principais, $I_1(K) = Ra_1$ e existe $x_1 \in K$ tal que $x_1 - a_1y_1 \in Ry_2 + \dots + Ry_n$. Seja $K_1 = K \cap (Ry_2 + \dots + Ry_n)$. Afirmando que $K = Rx_1 + K_1$. Com efeito, se $z = b_1y_1 + \dots + b_ny_n \in K$ então $b_1 \in I_1(K)$, daí $b_1 = da_1$

com $d \in R$. Segue-se que $z-dx_1 = z-d(x_1-a_1y_1)-b_1y_1 \in K_1$, logo $z \in Rx_1+K_1$ e temos $K \subseteq Rx_1+K_1$. A inclusão no outro sentido é imediata. Por hipótese de indução K_1 tem $m-1$ geradores e $m-1 \leq n-1$. Portanto, K tem n geradores e $m \leq n$. $\square$

Sejam $x_1, \dots, x_m$ os geradores de K . Então $x_1 = (\lambda_{11}, \dots, \lambda_{1n})$, $x_m = (\lambda_{m1}, \dots, \lambda_{mn})$. M é conhecido a partir de K e K a partir de $x_1, \dots, x_m$. Portanto M é conhecido pela matriz $m \times n$

$$F = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \dots & \lambda_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_{m1} & \dots & \lambda_{mn} \end{bmatrix}$$

onde interpretamos as linhas do F como geradores de K . Ora cada linha dessa matriz é um elemento do núcleo do homomorfismo θ . Assim temos que para todo $i = 1, \dots, m$, $\theta(\lambda_{i1}, \lambda_{i2}, \dots, \lambda_{in}) = 0$, isto é, $\lambda_{i1}u_1 + \lambda_{i2}u_2 + \dots + \lambda_{in}u_n = 0$. Podemos então dizer que $M = [u_1, \dots, u_n]$ é determinado pela matriz $F = [\lambda_{ij}]_{m \times n}$ e relações

$$(*) \quad \sum_{j=1}^n \lambda_{ij} u_j = 0 \quad \text{com } i = 1, 2, \dots, m,$$

isto é, M é gerado por $u_1, \dots, u_n$ e relações (*). Chamamos F de matriz de relações. Assim, um módulo finitamente gerado sobre $R = k[X]$ é determinado por uma matriz de relações. Procuro então um conjunto de geradores e um conjunto de relações as mais

simples possíveis.

DEFINIÇÃO: Dizemos que duas matrizes $F_{m \times n}$ e $F'_{m' \times n'}$ são equivalentes se M é gerado por $u_1, \dots, u_n$ e relações dadas por F e, ao mesmo tempo, M é gerado por $u'_1, \dots, u'_n$ e relações dadas por F' .

Esta é evidentemente uma relação de equivalência.

EXEMPLO 1: Seja $M = (0)$ o $k[X]$ -módulo nulo. Então $\theta : k[X]^n \rightarrow M$ é a aplicação nula. Assim, $\ker \theta = k[X]^n$. Portanto M é dado pela matriz $F = I_n$ ou por qualquer outra matriz $F' = I_m$ com $m \geq 1$. Logo $F \sim F'$.

EXEMPLO 2: Seja $M = [u_1, u_2]$ dado pela matriz

$$F = \begin{bmatrix} X & X^2 \\ 1 & 1+X \end{bmatrix} \quad \text{e relações} \quad \begin{aligned} Xu_1 + X^2u_2 &= 0 & (1) \\ u_1 + (1+X)u_2 &= 0 & (2). \end{aligned}$$

Desse sistema obtemos, multiplicando a equação (2) por X ,

$$Xu_1 + X^2u_2 = 0 \quad (1)$$

$$Xu_1 + (X + X^2)u_2 = 0 \quad X(2)$$

$X(2)-(1)$ nos dá $Xu_2 = 0$ e, substituindo em (1), $xu_1 = 0$. Te

mos então novas relações $Xu_1 = 0$ e $Xu_2 = 0$ que correspondem à matriz $F' = \begin{bmatrix} \bar{X} & 0 \\ 0 & X \end{bmatrix}$. Logo M é dado também por F' e temos $F \sim F'$. Isto significa que

$$M \simeq k[X]/(X) \times k[X]/(X) \simeq k \times k.$$

Nesse caso a matriz F' é mais compreensível do que a matriz F . Perguntamos então: como partindo de uma matriz F , podemos chegar a uma outra matriz de relações F' ? Veremos através da proposição a seguir, que isso pode ser feito de maneira muito interessante usando operações relacionadas com matrizes, as quais chamaremos de operações elementares.

Seja F uma matriz de relações. Pela Proposição 1 podemos considerar apenas matrizes quadradas. São as seguintes as operações elementares:

- (i) Multiplicar uma linha qualquer de F por um escalar não nulo $\lambda \in k$;
- (ii) Somar a uma linha qualquer de F uma outra linha multiplicada por $f(X) \in k[X]$;
- (iii) Multiplicar uma coluna qualquer de F por um escalar não nulo $\lambda \in k$;
- (iv) Somar a uma coluna qualquer de F uma outra coluna multiplicada por $f(X) \in k[X]$.

PROPOSIÇÃO 2: Seja M um módulo finitamente gerado sobre $k[X]$ e $F_{n \times n}$ uma matriz de relações de M . Se $F'_{n \times n}$ é uma matriz obtida de F por uma qualquer das operações elementares, então $F \sim F'$.

DEMONSTRAÇÃO: (i) Sejam $M = [u_1, \dots, u_n]$ e $F = [a_{ij}]_{n \times n}$. Suponha $F' = [b_{ij}]_{n \times n}$ é obtida de F pela operação (i), isto é, $b_{tj} = \lambda a_{tj}$ com $\lambda \neq 0$ e $b_{ij} = a_{ij}$ se $i \neq t$. Então

$$\sum_j b_{ij} u_j = \sum_j a_{ij} u_j = 0 \quad \text{se } i \neq t \text{ e, se } i = t,$$

$$\sum_j b_{tj} u_j = \sum_j \lambda a_{tj} u_j = \lambda \sum_j a_{tj} u_j = 0.$$

Logo F' é também uma matriz de relações de M . Além disso, como $\lambda \neq 0$, partindo de relações dadas por F' , podemos obter as relações dadas por F multiplicando a t -ésima relação por λ^{-1} . Assim, conhecendo-se F conhecemos F' e, reciprocamente. Logo M é também determinado pela matriz F' e, portanto $F \sim F'$.

(ii) Consideremos agora que $F' = [b_{ij}]_{n \times n}$ é obtida de $F = [a_{ij}]_{n \times n}$ através da operação (ii), isto é, $b_{tj} = a_{tj} + f a_{sj}$, $s \neq t$ e $b_{ij} = a_{ij}$ se $i \neq t$. Então,

$$\sum_j b_{ij} u_j = \sum_j a_{ij} u_j = 0 \quad \text{se } i \neq t \text{ e, se } i = t,$$

$$\sum_j b_{tj} u_j = \sum_j (a_{tj} + f a_{sj}) u_j = \sum_j a_{tj} u_j + f \sum_j a_{sj} u_j = 0.$$

Logo F' é também uma matriz de relações de M . Além disso, somando à t -ésima relação dada por F' a s -ésima relação dada por F' multiplicada por $(-f)$, obtemos de F' as relações dadas pela matriz F . Portanto $F \sim F'$.

(iii) Para a operação (iii) suponha que $F' = [b_{ij}]_{n \times n}$ onde $\forall i$ com $1 \leq i \leq n$, $b_{it} = \lambda a_{it}$ com $\lambda \neq 0$ e $b_{ij} = a_{ij}$ se $j \neq t$. Como $\lambda \neq 0$, $M = [u_1, \dots, \lambda^{-1}u_t, \dots, u_n]$. De fato, se $u \in M$ então

$$\begin{aligned} u &= \sum_i b_i u_i \quad \text{com } b_i \in k[X] \\ &= b_1 u_1 + \dots + (b_t \lambda) (\lambda^{-1} u_t) + \dots + b_n u_n \in [u_1, \dots, \lambda^{-1} u_t, \dots, u_n]. \end{aligned}$$

Logo $M \subseteq [u_1, \dots, \lambda^{-1}u_t, \dots, u_n]$ e, evidentemente, $[u_1, \dots, \lambda^{-1}u_t, \dots, u_n] \subseteq M$. Segue-se que para todo $i = 1, 2, \dots, n$,

$$\sum_j a_{ij} u_j = 0 \Leftrightarrow a_{i1} u_1 + \dots + (a_{it} \lambda) (\lambda^{-1} u_t) + \dots + a_{in} u_n = 0.$$

Portanto, M é gerado por $u_1, \dots, u_n$ e relações dadas por F e, ao mesmo tempo, M é gerado por $u_1, \dots, \lambda^{-1}u_t, \dots, u_n$ e relações dadas por F' e temos $F \sim F'$.

(iv) Finalmente, suponhamos que $F' = [b_{ij}]_{n \times n}$ é obtida de $F = [a_{ij}]_{n \times n}$ via operação (iv), isto é, $\forall i$ com $1 \leq i \leq n$ $b_{it} = a_{it} + f a_{is}$ com $f \in k[X]$ e $b_{ij} = a_{ij}$ se $j \neq t$. Afirimo que $M = [u_1, \dots, u_s - f u_t, u_{s+1}, \dots, u_n]$. Com efeito, se $u \in M$ então

$$\begin{aligned} u &= b_1 u_1 + \dots + b_s u_s + \dots + b_t u_t + \dots + b_n u_n \\ &= b_1 u_1 + \dots + b_s (u_s - f u_t) + \dots + (b_t - b_s f) u_t + \dots + b_n u_n \end{aligned}$$

que está em $[u_1, \dots, u_s - f u_t, \dots, u_t, \dots, u_n]$. Logo

$M \subseteq [u_1, \dots, u_s - f u_t, \dots, u_t, \dots, u_n]$. A inclusão no outro sentido é imediata. Segue-se que para todo $i = 1, 2, \dots, n$

$$\sum_j a_{ij} u_j = 0 \Leftrightarrow a_{i1} u_1 + \dots + a_{is} (u_s - f u_t) + \dots + (a_{it} + f a_{is}) u_t + \dots + a_{in} u_n = 0.$$

Portanto M é gerado por $u_1, \dots, u_n$ e relações dadas por F e ao mesmo tempo M é gerado por $u_1, \dots, u_s - f u_t, u_{t+1}, \dots, u_n$ e relações dadas por F' e temos $F \sim F'$. $\square$

Com esta proposição reduzimos o estudo dos módulos finitamente gerados sobre $k[X]$ ao estudo das matrizes com entradas em $k[X]$. Passamos então a trabalhar com essas matrizes, criando condições para darmos a estrutura de $k[X]$ -módulos de tipo finito. De acordo com a Proposição 1 podemos considerar apenas matrizes quadradas.

Considere as matrizes quadradas $[\lambda_{ij}]_{n \times n}$ onde cada λ_{ij} é um polinômio em X com coeficientes no corpo k . Dizemos que uma matriz F é equivalente a uma matriz G se F puder ser obtida de G por uma série finita de operações elementares.

O resultado seguinte nos dá mais uma operação muito útil que é obtida a partir daquelas definidas anteriormente.

PROPOSIÇÃO 3: *Quaisquer duas linhas de uma matriz podem ser permutadas usando as operações (i) e (ii); quaisquer duas colunas podem ser permutadas usando-se (iii) e (iv).*

DEMONSTRAÇÃO: Suponha que queremos permutar a i -ésima linha L_i , e a j -ésima linha L_j , de uma matriz F . Isso é possível através da aplicação da seguinte série de operações elementares.

- (a) some a linha L_j à linha L_i obtendo assim uma nova i -ésima linha $L_i' = L_i + L_j$;
- (b) some a linha L_i' multiplicada por (-1) à linha L_j obtendo uma nova j -ésima linha L_j' ;
- (c) multiplique a linha L_j' por (-1) , obtendo L_j'' ;
- (d) some a linha L_j'' multiplicada por (-1) à linha L_i' .

Para permutar quaisquer duas colunas da matriz F executamos na mesma sequência operações análogas com as colunas. $\square$

Segue desse resultado que se F difere de G apenas na ordem das linhas ou colunas então F é equivalente a G .

A relação " F é equivalente a G " definida acima, é uma relação de equivalência. Com efeito,

1. **A RELAÇÃO É TRANSITIVA:** Se F é equivalente a G e G é equivalente a H então F é equivalente a H . Por hipótese, G

pode ser obtida de H e F de G por uma série finita de operações elementares. Consequentemente F pode ser obtida de H por uma série finita dessas operações.

2. A RELAÇÃO É SIMÉTRICA: Se F pode ser obtida de G por uma série finita de operações elementares então G pode ser obtida de F por uma série finita de operações elementares. Mostremos primeiro que se F pode ser obtida de G por uma só operação elementar, então G também pode ser obtida de F por uma só operação elementar. Para isto consideremos cada um dos quatro tipos de operações elementares. Seja F obtida de G pela operação (i) por multiplicação da i-ésima linha de G por um escalar não-nulo λ . Então multiplicando a i-ésima linha de F por λ^{-1} obteremos G. Agora seja F obtida de G via operação (ii), por exemplo somando-se à i-ésima linha de G a j-ésima linha multiplicada por f. Nesse caso, somando-se à i-ésima linha de F a j-ésima linha multiplicada por (-f) obteremos G. Análogas afirmações são verdadeiras para operações dos tipos (iii) e (iv). Consequentemente, para cada operação elementar existe uma operação elementar inversa. Portanto, se F é obtida de G por uma série finita de operações elementares, aplicando as operações inversas na ordem oposta obteremos G de F.

3. A RELAÇÃO É REFLEXIVA: Aplicando a F duas operações que são inversas uma da outra, obteremos novamente F.

Desta forma as matrizes de polinômios podem ser divididas em classes de equivalência. Aqui surge a questão se existe ou não um certo tipo de matriz de polinômios tal que cada classe de equivalência contém uma e uma única matriz dessa forma. Uma forma com essa propriedade é chamada *canônica*. Mostraremos que para matrizes de polinômios, a forma diagonal com certas condições de divisibilidade é uma forma canônica no sentido acima.

É através dessa matriz que caracterizaremos os módulos finitamente gerados sobre $k[x]$.

DEFINIÇÃO: Uma matriz de polinômios da forma

$$\begin{bmatrix} f_1 & & & & \\ & f_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & f_n \end{bmatrix}$$

é chamada *matriz diagonal canônica* se cada elemento diagonal f_i é um divisor do seguinte f_{i+1} , e se todos os elementos diagonais não nulos tem coeficiente líder 1.

É claro que se a diagonal contém polinômios nulos, eles devem ocorrer nos últimos lugares, desde que 0 não é divisor de nenhum polinômio não-nulo. Por outro lado, se a diagonal contém escalares diferentes de zero, então eles devem ser iguais a 1 e ocu

$$F = \begin{bmatrix} f_{11} & \dots & f_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ f_{n1} & \dots & f_{nn} \end{bmatrix}$$

essa matriz. Mostraremos que todos os elementos da primeira linha e primeira coluna de F são divisíveis por f_{11} . Pelo Algoritmo Euclidiano, para cada $i = 2, \dots, n$

$$(1) \quad f_{1i} = f_{11}q_i + r_i \quad \text{onde} \quad r_i = 0 \quad \text{ou} \quad \partial r_i < \partial f_{11}$$

Execute em F a seguinte operação elementar: Some à i -ésima coluna a primeira coluna multiplicada por $-q_i$. A igualdade (1) mostra que o elemento da primeira linha e i -ésima coluna da nova matriz é r_i . Se $r_i \neq 0$, permutando a primeira e a i -ésima coluna obtemos uma matriz equivalente a F cujo elemento do canto superior esquerdo é r_i que tem grau menor do que o grau de f_{11} , o que contraria a escolha de F . Portanto $r_i = 0$. Um argumento análogo mostra que f_{11} divide todos os elementos da primeira coluna.

Com q_i como acima, execute as seguintes operações elementares em F : Some à segunda coluna a primeira multiplicada por $-q_2$; depois some à terceira coluna a primeira multiplicada por $-q_3$, e assim sucessivamente. Execute operações análogas nas linhas. Como resultado, F será transformada na matriz equivalente

$$(2) \quad H = \begin{bmatrix} f_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & h_{22} & \dots & h_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & h_{n2} & \dots & h_{nn} \end{bmatrix}$$

onde h_{ij} são polinômios obviamente.

Afirmo que todos os h_{ij} são divisíveis por f_{11} . Se h_{ij} não fosse divisível por f_{11} , somando-se a i -ésima linha de H à primeira, obteríamos uma matriz $\bar{H}$ com as seguintes propriedades:

- (a) $\bar{H}$ é equivalente a G ;
- (b) o elemento no canto superior esquerdo de $\bar{H}$ é não-nulo e de grau mínimo possível;
- (c) na primeira linha de $\bar{H}$ há um elemento h_{ij} que não é divisível pelo primeiro elemento dessa linha.

Assim, pelo argumento precedente a propriedade (c) contradiz as duas primeiras, e a afirmação está provada. Demonstraremos então que para cada matriz G existe uma matriz equivalente H da forma (2), onde todos h_{ij} são divisíveis por f_{11} . Executamos agora operações elementares na matriz

$$H_1 = \begin{bmatrix} h_{22} & \dots & h_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ h_{n2} & \dots & h_{nn} \end{bmatrix} .$$

Cada operação elementar de H_1 pode ser considerada uma operação elementar de H . É fácil ver que a primeira linha e a primeira coluna de H são deixadas inalteradas. Além disso, como todos os elementos de H_1 são divisíveis por f_{11} , todos os elementos da nova matriz, obtida de H_1 como resultado de operações elementares, serão também divisíveis por f_{11} .

Aplicando o resultado provado acima à matriz H_1 , vemos que por operações elementares podemos obter de H_1 uma matriz da forma

$$K_1 = \begin{bmatrix} k_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & p_{33} & \dots & p_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & p_{n3} & & p_{nn} \end{bmatrix}$$

e, conseqüentemente de H uma matriz da forma

$$L = \begin{bmatrix} f_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & k_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & p_{33} & \dots & p_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & p_{n3} & & p_{nn} \end{bmatrix}$$

onde todos os p_{ij} são divisíveis por k_{22} e k_{22} é divisível por f_{11} . Continuando esse processo, depois de um número finito de passos obtemos a forma canônica diagonal desejada. $\square$

Não é difícil extrair da nossa demonstração um método prático para reduzir matriz de polinômios à forma canônica diagonal. A idéia é usar operações elementares, primeiro para obter um elemento no canto superior esquerdo de grau mínimo, depois para obter zeros nos lugares restantes na primeira linha e na primeira coluna. Feito isso, aplicar o mesmo método à matriz H_1 , e assim por diante.

O Teorema 1 afirma que cada classe de equivalência de matrizes contém pelo menos uma matriz canônica diagonal. A seguir, veremos um exemplo.

EXEMPLO 1: Vamos reduzir a matriz

$$\begin{bmatrix} 1-X & X^2 & X \\ X & X & -X \\ 1+X^2 & X^2 & -X^2 \end{bmatrix}$$

à forma canônica diagonal.

$$\begin{bmatrix} 1-X & X^2 & X \\ X & X & -X \\ 1+X^2 & X^2 & -X^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 \rightarrow L_1+L_2} \begin{bmatrix} 1 & X^2+X & 0 \\ X & X & -X \\ 1+X^2 & X^2 & -X^2 \end{bmatrix} \sim$$

$$C_2 \rightarrow C_2 - (X^2+X)C_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ X & -X^3-X^2+X & -X \\ 1+X^2 & -X^4-X^3-X & -X^2 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_2 \rightarrow L_2 - XL_1 \\ L_3 \rightarrow L_3 - (1+X^2)L_1 \end{array} \sim$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -X^3-X^2+X & -X \\ 0 & -X^4-X^3-X & -X^2 \end{bmatrix} \begin{array}{l} C_2 \leftrightarrow C_3 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -X & -X^3-X^2+X \\ 0 & -X^2 & -X^4-X^3-X \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{array}{l} L_2 \rightarrow -L_2 \\ C_3 \rightarrow C_3 - (X^2+X-1)C_2 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & X & X^3+X^2-X \\ 0 & -X^2 & -X^4-X^3-X \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & X & 0 \\ 0 & -X^2 & -X(X+1) \end{bmatrix}$$

$$L_3 \xrightarrow{\sim} L_3 + XL_2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & X & 0 \\ 0 & 0 & -X(X+1) \end{bmatrix} \quad L_3 \xrightarrow{\sim} (-1)L_3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & X & 0 \\ 0 & 0 & X(X+1) \end{bmatrix}$$

O Teorema 1 de fato fornece a estrutura de um módulo M finitamente gerado sobre o anel de polinômios $k[X]$ sobre um corpo k . Como afirmamos no início deste capítulo, se M é dado por uma matriz F , então as linhas de F proporcionam relações entre geradores de F . Se, F é equivalente a G e G está na forma canônica diagonal, digamos

$$\begin{bmatrix} g_1 & & & 0 \\ & g_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & g_n \end{bmatrix}$$

com $g_i | g_{i+1} \quad \forall i = 1, 2, \dots, n-1$. Então M também é gerado por $u_1, u_2, \dots, u_m$ onde $g_i u_i = 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$ e $g_i | g_{i+1}$.

Seja então $e_1, e_2, \dots, e_n$ a base canônica de $k[X]^n$; isto é, $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ onde 1 ocupa o i -ésimo lugar. Pode-se definir um homomorfismo de módulos $\theta: k[X]^n \rightarrow M$ por $\theta(e_i) = u_i$; então o núcleo K é dado pela matriz G ; isto é, $K = \{(h_1, h_2, \dots, h_n)$ onde g_i divide h_i , $i = 1, 2, \dots, n\}$.

Assim M é isomorfo como $k[X]$ -módulo ao produto direto

$$\frac{k[X]}{(g_1)} \times \frac{k[X]}{(g_2)} \times \dots \times \frac{k[X]}{(g_n)}$$

onde mais ainda se tem: $g_i | g_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots, n-1$. Note ainda mais que se $g_n = 0$ então $\frac{k[X]}{(g_n)} \cong k[X]$ e se $g_1 = 1$, então $\frac{k[X]}{(g_1)} \cong (0)$.

Assim temos demonstrado o seguinte teorema, que é de suma importância:

TEOREMA 2 (TEOREMA FUNDAMENTAL PARA MÓDULOS FINITAMENTE GERADOS SOBRE $k[X]$): *Seja M um módulo finitamente gerado sobre $k[X]$. Então*

$$M \cong k[X]^r \oplus k[X]/(f_1(X)) \oplus \dots \oplus k[X]/(f_{n-r}(X))$$

onde $n, r \in \mathbb{N}$, $r \leq n$ e $f_i | f_{i+1}$, $1 \leq i \leq n-r-1$. Além disso os ideais $(f_i(X))$, $1 \leq i \leq n-r$ são unicamente determinados por M . De fato, os $f_i(X)$ são únicos, se são mônicos.

DEMONSTRAÇÃO: Resta provar apenas a última parte do enunciado. Note que se $M \cong \frac{k[X]}{(f_1)} \times \dots \times \frac{k[X]}{(f_n)}$, onde os f_i , são mônicos e $f_i | f_{i+1}$ para $i = 1, 2, \dots, n-1$, então M é dado por uma matriz de relações

$$F = \begin{bmatrix} f_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & f_n \end{bmatrix}$$

na forma canônica diagonal. Logo basta mostrar que a forma canônica diagonal de uma matriz é única. Este segue do seguinte resultado como corolário.

Seja F uma matriz de polinômios de ordem n . Considere todos os menores possíveis de ordem r de F sendo $r \leq n$. Esses menores são polinômios em X . Chamaremos de máximo divisor comum desses menores e o denotaremos por $D_r(X)$ ao divisor comum de maior grau com coeficiente líder 1. Se todos os menores de ordem r são nulos, então definimos $D_r(X) = 0$. Em particular, $D_1(X)$ é o máximo divisor comum dos elementos da matriz F ; $D_n(X)$ é o determinante de F dividido pelo seu coeficiente líder, a menos que $D_n(X) = 0$.

TEOREMA 3: Se F_1 e F_2 são matrizes equivalentes de polinômios e $D_{r1}(X)$ e $D_{r2}(X)$ denotam os máximos divisores comuns dos menores de ordem r de F_1 e F_2 respectivamente, então $D_{r1}(X) = D_{r2}(X)$.

DEMONSTRAÇÃO: Como F_1 e F_2 são equivalentes, F_2 pode ser obtida de F_1 por uma série de operações elementares. Suponha

inicialmente que esta série consiste de uma operação elementar . Por exemplo, seja F_2 obtida de F_1 pela multiplicação da i -ésima linha de F_1 por um escalar $\lambda \neq 0$. Os menores correspondentes de F_1 e F_2 são idênticos ou diferem por um fator λ . Como um fator constante não influencia o cálculo do máximo divisor comum, temos $D_{r1} = D_{r2}$. A situação é a mesma quando F_2 é obtida de F_1 pela multiplicação de uma coluna de F_1 por λ . Suponha agora que F_2 é obtida de F_1 por uma operação do tipo (ii) ou (iv); seja F_2 o resultado da adição da j -ésima linha multiplicada por $f(X)$ à i -ésima linha de F_1 . Vamos mostrar que D_{r1} divide D_{r2} .

Os menores de F_1 e F_2 podem ser divididos em três classes: . Na primeira colocamos aqueles que não contêm elementos da i -ésima linha. Nesse caso, os menores correspondentes de F_1 e F_2 são evidentemente iguais. Na segunda classe colocamos aqueles menores que contêm elementos de ambas as linhas i -ésima e j -ésima. Como um determinante não se altera se somarmos a uma linha um múltiplo de outra linha, os menores correspondentes de F_1 e F_2 são iguais também nessa classe. Finalmente, na terceira classe colocamos aqueles menores que contêm elementos da i -ésima linha mas não contêm elementos da j -ésima. Nessa classe os menores correspondentes são da forma

$$M_1 = \begin{vmatrix} \dots\dots\dots \\ f_{iv_1} \dots f_{iv_r} \\ \dots\dots\dots \end{vmatrix}, \quad M_2 = \begin{vmatrix} \dots\dots\dots \\ f_{iv_1} + f(X) \cdot f_{jv_1} \dots f_{iv_r} + f(X) \cdot f_{jv_r} \\ \dots\dots\dots \end{vmatrix}$$

onde as linhas que não foram escritas são idênticas. Pela propriedade de adição de determinantes,

$$M_2 = \begin{vmatrix} \dots\dots\dots \\ f_{iv_1} \dots f_{iv_r} \\ \dots\dots\dots \end{vmatrix} + f(X) \begin{vmatrix} \dots\dots\dots \\ f_{jv_1} \dots f_{jv_r} \\ \dots\dots\dots \end{vmatrix} = M_1 + f(X)N_1.$$

onde N_1 é algum menor da matriz F_1 . Todos os menores de ordem r de F_1 são divisíveis por D_{r1} . Logo D_{r1} divide tanto M_1 como N_1 . Segue-se da igualdade acima que todos os menores de ordem r de F_2 são divisíveis por D_{r1} . Isto significa que D_{r1} divide o máximo divisor comum dos menores de ordem r de F_2 , isto é, D_{r1} divide D_{r2} . Aplicando a operação inversa que também é do tipo (ii) a F_2 , obtemos F_1 . Logo, D_{r2} divide D_{r1} , e portanto $D_{r1} = D_{r2}$. Um argumento análogo vale no caso de uma operação do tipo (iv). Desse modo o teorema fica demonstrado no caso em que F_2 é obtida de F_1 por uma operação elementar. Ora, se $D_r(X)$ não é alterado por cada operação elementar separadamente numa série, é evidente que não será alterado pela série de operações elementares. Isto prova o Teorema 2.

Consideremos os polinômios $D_1(X), \dots, D_n(X)$ numa matriz cuja forma canônica é

$$D = \begin{bmatrix} d_1(x) & & & & \\ & d_2(x) & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & d_n(x) \end{bmatrix}$$

Para obter um menor de ordem r , devemos suprimir $n-r$ linhas e $n-r$ colunas. Se a i -ésima linha é eliminada, então a i -ésima coluna da nova matriz assim obtida contém apenas zeros. Sendo assim, para obter um menor não nulo, devemos suprimir linhas e colunas correspondentes. Logo os menores de ordem r devem ser da forma

$$\begin{vmatrix} d_{v_1}(x) & & & & \\ & d_{v_2}(x) & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & d_{v_r}(x) \end{vmatrix} = d_{v_1}(x) d_{v_2}(x) \dots d_{v_r}(x), \quad (3)$$

e $D_r(X)$ é o máximo divisor comum desses menores. Das desigualdades $1 \leq v_1 < \dots < v_r \leq n$ segue-se que $1 \leq v_1, 2 \leq v_2, \dots, r \leq v_r$.

Assim $d_{v_i}(X)$ é divisível por $d_i(X)$, e isto significa que $d_{v_1}(X) \dots d_{v_r}(X)$ é divisível por $d_1(X) \dots d_r(X)$. Consequentemente, cada menor de ordem r da matriz D é divisível pelo menor de ordem r

$$\begin{vmatrix} d_1(X) & & & \\ & \ddots & & \\ & & & d_r(X) \end{vmatrix} = d_1(X) \dots d_r(X) \quad (4)$$

Se esse menor é nulo, então todos os menores de ordem r de D são nulos e por definição $D_r(X) = 0$. Se o menor (4) é não-nulo, então os polinômios $d_1(X), \dots, d_r(X)$ são não-nulos e têm coeficientes líderes 1. Como todo menor (3) é divisível por (4), $D_r(X)$ coincide com (4). Consequentemente temos

$$D_r(X) = d_1(X) \dots d_r(X) \quad (5)$$

COROLÁRIO: *A forma canônica diagonal de uma matriz F é única.*

DEMONSTRAÇÃO: Sejam

$$D = \begin{bmatrix} d_1(x) & & & & \\ & d_2(x) & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & d_n(x) \end{bmatrix} \quad e \quad E = \begin{bmatrix} e_1(x) & & & & \\ & e_2(x) & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & e_n(x) \end{bmatrix}$$

duas matrizes diagonais equivalentes a F onde os $d_i(x)$ e $e_i(x)$ são mônicos e $d_i | d_{i+1}$ e $e_i | e_{i+1} \quad \forall i = 1, 2, \dots, n-1$. Se indicamos por $D_r(x)$ e $E_r(x)$ os máximos divisores comuns de menores de ordem r de D e E respectivamente, então $D_r = E_r$ pelo Teorema 2. Por outro lado, pela observação feita acima, $D_r = d_1 d_2 \dots d_r$ e $E_r = e_1 e_2 \dots e_r$. Assim $d_1 = e_1$, $d_1 d_2 = e_1 e_2, \dots$, $d_1 d_2 \dots d_r = e_1 e_2 \dots e_r$, etc. Segue-se que $d_i = e_i, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$ desde que todos eles são não-nulos. Assim, nesse caso, vale a unicidade da forma canônica.

Suponhamos agora que existe $s, \quad 0 \leq s \leq n-1$ tal que $d_1, d_2, \dots, d_s \neq 0$ e $d_{s+1} = 0$. (Por definição $d_0 = 1$.) Então o argumento acima mostra que $d_1 = e_1, \quad d_2 = e_2, \dots, d_s = e_s$ e $d_{s+1} = e_{s+1} = 0$. Ora, $d_{s+2} = \dots = d_n = 0$ e $e_{s+2} = \dots = e_n = 0$ donde segue-se que $d_i = e_i \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$. Fica assim demonstrada a unicidade da forma canônica diagonal de uma matriz F . $\square$

CAPÍTULO VI

MÓDULOS FINITAMENTE GERADOS SOBRE $\mathbb{Z}_p[[X]]$

A estrutura de módulos sobre o anel $\mathbb{Z}_p[[X]]$ se tornou importante no estudo de corpos ciclotômicos, isto é, extensões finitas e infinitas do corpo $\mathbb{Q}$ dos números racionais obtidas por adjução de raízes da unidade. A adjução de todas as raízes da unidade parece difícil de estudar. Iwasawa em 1958 iniciou o estudo de $\mathbb{Z}_p$ -extensões de corpos k de números algébricos. L/k é uma $\mathbb{Z}_p$ -extensão se $\text{Gal}(L/k) \cong \mathbb{Z}_p$, grupo aditivo dos inteiros p -ádicos. Se α_n é uma raiz p^n -ésima primitiva da unidade, então indique: $k_n = k(\alpha_n)$ e $k_\infty = \bigcup_{n \geq 0} k_n$. O grupo de Galois $\text{Gal}(k_\infty/k) \cong \mathbb{Z}_p \times \frac{\mathbb{Z}}{(p-1)}$. Logo existe uma extensão L/K tal que $\text{Gal}(L/k) \cong \mathbb{Z}_p$. De fato, L é o subcorpo fixo de k_∞ fixado pelo grupo $\frac{\mathbb{Z}}{(p-1)}$. Neste caso, L/K é uma $\mathbb{Z}_p$ -extensão. Ora., $\mathbb{Z}_p = \lim_{\leftarrow} \frac{\mathbb{Z}}{p^n \mathbb{Z}}$. $\mathbb{Z}_p \supset (p) \supset (p^2) \supset \dots \supset (p^n) \supset \dots \supset (0)$ e portanto temos uma cadeia ascendente de subcorpos $k = L_0 \subset L_1 \subset L_2 \subset \dots \subset L_n \subset \dots$. $L = \bigcup L_n$, $\text{Gal}(L_n/k) \cong \frac{\mathbb{Z}}{p^n \mathbb{Z}}$. Assim cada L_n é um Γ_n -módulo e portanto L também o é. De fato, L é um $\mathbb{Z}_p[\Gamma_n]$ -módulo, onde $\mathbb{Z}_p[\Gamma_n]$ é um anel de grupo Γ_n sobre o anel $\mathbb{Z}_p$. A observação importante é que temos homomorfismos naturais $\mathbb{Z}_p[\Gamma_{n+1}] \rightarrow \mathbb{Z}_p[\Gamma_n]$ compatíveis, de modo que $\mathbb{Z}_p[\Gamma] = \lim_{\leftarrow} \mathbb{Z}_p[\Gamma_n]$ como anel. Como

$\mathbb{Z}_p[\Gamma] \cong \mathbb{Z}_p[[X]]$ o anel de séries formais, via o fato $\mathbb{Z}_p[\Gamma_n] \cong \frac{\mathbb{Z}_p[X]}{(X^{p^n} - 1)}$, L se torna um $\mathbb{Z}_p[[X]]$ -módulo. Não é por esse fato

que a estrutura de módulos finitamente gerados sobre $\mathbb{Z}_p[[X]]$ se torna interessante. O interesse real está na estrutura de uma parte (a parte p -primária) do grupo das classes de corpos L_n .

Seja F um corpo de números algébricos e H/F o corpo de classes de Hilbert; isto é, H/F é a extensão abeliana não-ramificada maximal. A Teoria de Corpos de Classes assegura que $\text{Gal}(H/F)$ é isomorfo ao grupo de classes de ideais de F !

Agora considere apenas o p -Sylow subgrupo C_n do grupo das classes de L_n onde L/k é uma $\mathbb{Z}_p$ -extensão e $k = L_0 \subset L_1 \subset \dots \subset L_n \dots$ uma cadeia como indicada acima. Temos um homomorfismo $C_{n+1} \rightarrow C_n$ natural e portanto $C = \varprojlim C_n$ tem sentido. Um resultado de Iwasawa afirma que C é um $\mathbb{Z}_p[[X]]$ -módulo finitamente gerado. A prova apresenta C como um grupo de Galois de uma p -extensão abeliana não ramificada e usa o citado resultado da Teoria de Corpos de Classes. Daí obtém-se a cardinalidade de C_n !

Assim vemos como é importante a estrutura de módulos finitamente gerados sobre o anel $\mathbb{Z}_p[[X]]$. A prova original de Iwasawa é complicada. Serre observou (Classes de Corps Cyclotomiques, d'après Iwasawa, Seminaire Bourbaki, 1958) que $\mathbb{Z}_p[[X]]$ é um anel de dimensão 2 e deduziu o resultado de Iwasawa do Teorema de estrutura de módulos finitamente gerados sobre domínios de Krull ;

este último resultado usa a teoria de divisores. Lang [6] e Washington [15] apresentam uma prova matricial e a nossa tentativa de compreender esta prova nos levou a incluir o Capítulo V. O objetivo é partir de uma matriz $m \times n$ cujas entradas são séries formais e executar operações admissíveis de maneira a conseguir uma matriz mais simples que também descreva o módulo em questão. Entram operações elementares como no Capítulo V e entram também operações "pseudo-elementares" que nos permitem omitir pedaços finitos. A justificativa para omitir esses pedaços finitos vem também da Teoria de Galois, pois o módulo em questão ao ser visto como grupo de Galois, é um grupo profinito e portanto pode ser descrito módulo grupos finitos. Topologicamente os dois são isomorfos.

No capítulo anterior usamos fortemente o algoritmo euclidiano de divisão. Na presente situação, o análogo é o Teorema de Preparação de Weierstrass que fornece um algoritmo de divisão. Apresentamos este Teorema numa situação mais geral, trabalhando com o anel de séries formais $R[[X]]$ onde R é um anel local Hausdorff completo.

1. TEOREMA DE PREPARAÇÃO DE WEIERSTRASS

Seja R um anel não-nulo. Seja $f = \sum_{i \geq 0} f_i x^i \in R[[X]]$,

$f_i \in R$. Definimos grau de f em X relativo a R e denotamos por $\text{gr} f$ como sendo $\text{gr} f$ em X se $0 \neq f \in R[X]$; $-\infty$ se $f = 0$ e ∞ se $f \notin R[X]$.

Suponha que R é um anel local cujo ideal maximal é M . Definimos grau de Weierstrass de $f \neq 0$ relativo a R e denotamos por $\text{gr}_W f$ como sendo o mínimo i tal que $f_i \notin M$ se $f \notin M[[X]]$; e ∞ se $f \in M[[X]]$.

Dizemos que $f \in R[X]$ é $R[X]$ -distinguido se, $d = \text{gr}_W f < \infty$, $f_d = 1$ e $f_i = 0$ para todo $i > d$. Note que neste caso f é um polinômio. Chamaremos f de polinômio distinguido em X (de grau d) com coeficientes em R .

PROPOSIÇÃO 1: Seja R um anel local. Se f, g e $h \in R[[X]]$ tem-se (das definições acima) que

(i) $\text{gr}_W fg = \text{gr}_W f + \text{gr}_W g$, desde que $f, g, fg \neq 0$;

(ii) $h \in M[[X]] \iff \text{gr}_W h = \infty$; ($h \neq 0$);

(iii) h é uma unidade em $R[[X]] \iff \text{gr}_W h = 0$;

(iv) Se $f \neq 0$ e $g \neq 0$ são $R[[X]]$ -associados então $\text{gr}_W f = \text{gr}_W g$;

(v) f é distinguido $\iff \text{gr} f = \text{gr}_W f < \infty$ e f é mônico;

(vi) Se f é distinguido, g é um polinômio mônico em X com coeficientes em R e g divide f em $R[X]$,

então g é distinguido.

DEMONSTRAÇÃO: (i) Basta considerar o caso onde $gr_w f < \infty$ e $gr_w g < \infty$. Sejam $f = \sum f_i X^i$ e $g = \sum g_i X^i$. Então $fg = \sum h_i X^i$ onde $h_i = f_0 g_i + f_1 g_{i-1} + \dots + f_i g_0$. Suponha $gr_w f = j$ e $gr_w g = k$. Então $h_{j+k} = f_0 g_{j+k} + \dots + f_i g_k + \dots + f_{j+k} g_0$. Como f_j e $g_k \notin M$, $f_j g_k \notin M$ e $f_\lambda g_\mu \in M$ se $(\lambda, \mu) \neq (j, k)$. Dai $h_{j+k} \notin M$. também, e para qualquer $s < j + k$, $h_s \in M$. Portanto

$$gr_w fg = j + k = gr_w f + gr_w g.$$

(ii) É a definição de $gr_w f$.

(iii) $h = \sum h_i X^i$ é uma unidade de $R[[X]] \Leftrightarrow h_0$ é uma unidade de $R \Leftrightarrow h_0 \notin M \Leftrightarrow gr_w h = 0$.

(iv) Se f e g são $R[[X]]$ -associados então $f = \delta g$ onde δ é uma unidade em $R[[X]]$. Por (i) $gr_w f = gr_w \delta g = gr_w \delta + gr_w g$. Por (ii) $gr_w \delta = 0$ e temos $gr_w f = gr_w g$.

(v) É a definição de um elemento distinguido.

(vi) Se $d = gr_w f < \infty$, $f_d = 1$ e $f_i = 0$ para todo $i > d$. Se $g|f$ em $R[X]$ então $f = rg$ com $r \in R[X]$. De $f = rg$ tem-se, $gr f = gr r + gr g$, pois g é mônico, e $gr_w f = gr_w r + gr_w g$. Se $gr g > gr_w g$ então

$$\begin{aligned} gr f &> gr r + gr_w g \\ &\geq gr_w r + gr_w g \\ &= gr_w f, \end{aligned}$$

uma contradição ao fato que f é distinguido. Logo $\text{gr}_w g = \text{gr}_w f$ e sendo g mônico, g é distinguido.

TEOREMA 1: (Teorema de Preparação de Weierstrass) Seja (R, M) um anel local Hausdorff completo e sejam $f, g \in R[[X]]$.

- (i) Se $\text{gr}_w f < \infty$ então existem únicos elementos $q \in R[[X]]$ e $r \in R[X]$ tais que $g = qf + r$ e $\text{gr}_w r < \text{gr}_w f$;
- (ii) Se f e g são distinguidos então f e g são $R[[X]]$ -associados se, e somente se $f = g$;
- (iii) Se f é distinguido e $g \in R[X]$ então $q \in R[X]$. Se, além disso, g é também distinguido e $r = 0$ então q é distinguido;
- (iv) $f \notin M[[X]]$ se, e somente se f é um $R[[X]]$ -associado de um elemento distinguido f^* , isto é, $f = \delta f^*$ onde δ é uma unidade em $R[[X]]$; e nesse caso f^* e δ são unicamente determinados por f ;
- (v) Se f é distinguido e $f = f_1 \dots f_s$ com $f_1, \dots, f_s$ em $R[[X]]$ então f_i é um $R[[X]]$ -associado de um polinômio distinguido f_i^* , $i = 1, \dots, s$ e $f = f_1^* \dots f_s^*$.

DEMONSTRAÇÃO: (i) Seja $f = \sum_{i \geq 0} f_i X^i$, $f_i \in R$ e $d = \text{gr}_w f$. Sejam $f' = \sum_{i=0}^{d-1} f_i X^i$ e $f^* = \sum_{i \geq d} f_i X^{i-d}$. Então f^* é uma unidade de

$R[[X]]$ e $f \in M[[X]]$. Daí $F = -\frac{f'}{f^*} \in [[X]]$ e $f = (X^d - F)f^*$. Sejam $Q = f^*q$ e $G = g$. Assim nossa afirmação se torna equivalente à seguinte: dados $G \in R[[X]]$ e $F \in M[[X]]$, existe único $Q \in R[[X]]$ tal que $[G - (X^d - F)Q]$ é um polinômio de grau $< d$. De fato, suponha que $g = qf + r$ e $\text{gr } r < \text{gr}_w f$. Pondo-se $Q = f^*q$ temos $\text{gr}[G - (X^d - F)Q] = \text{gr}(g - qf) = \text{gr } r < d$. Reciprocamente, se existe único $Q \in R[[X]]$ com $\text{gr}[G - (X^d - F)Q] < \infty$, então tomando $r = G - (X^d - F)Q$ e $q = \frac{Q}{f^*}$, $qf = (X^d - F)Q$ e temos $G = g = qf + r$.

UNICIDADE DE Q: É suficiente mostrar que se $Q = \sum_{i \geq 0} Q_i X^i$, $Q_i \in R$, $\text{gr}(X^d - F)Q < d$ então $Q = 0$. Com efeito, se $Q' \in R[[X]]$ é tal que $\text{gr}[G - (X^d - F)Q'] < d$ então

$$\text{gr}[G - (X^d - F)Q - (G - (X^d - F)Q')] = \text{gr}[(X^d - F)(Q' - Q)] < d.$$

Logo $Q' - Q = 0$ e daí $Q' = Q$. Ora, suponha que $Q \in M^u[[X]]$ com $u \geq 0$. Seja $e \geq 0$ um inteiro qualquer. Então o coeficiente de X^{d+e} em $(X^d - F)Q$ é zero, pois $d+e \geq d$. Por outro lado, o coeficiente de X^{d+e} em $(X^d - F)Q$ consiste de uma expressão $Q_e +$ soma de termos da forma $F_i Q_j$. Como cada $Q_j \in M^u$ e cada $F_i \in M$, temos $F_i Q_j \in M^{u+1}$. Daí $Q_e \in M^{u+1}$. Como e é arbitrário segue que $Q \in M^{u+1}[[X]]$. Repetindo-se o argumento com $u+1$ em lugar de u , segue que $Q \in M^u[[X]]$ para todo $u \geq 0$. Isto quer dizer que para todo $i \geq 0$, os coeficientes Q_i de Q pertencem a $\bigcap_{u \geq 0} M^u$. Pelo Teorema de Krull $\bigcap_{n \geq 0} M^n = (0)$. Logo $Q = 0$.

EXISTÊNCIA: Usando o fato de que $f \in M[[X]]$, sucessivamente tentaremos encontrar $Q^{(u)} \in M^u[[X]]$ tal que $Q = Q^{(0)} + Q^{(1)} + \dots$, isto é, Q será uma soma infinita de séries formais de maneira que Q tenha sentido. Isto é feito para garantir que $\text{gr}(G - (X^d - F)Q) < d$.

Escreva $G = \sum_{i \geq 0} G_i X^i$, $F = \sum_{i \geq 0} F_i X^i$, onde $G_i \in R$ e $F_i \in M$ $\forall i \geq 0$. A idéia é proceder da seguinte maneira: Escrevamos

$Q = Q^{(0)} + Q^{(1)} + \dots + Q^{(u)} + \dots$ onde os $Q^{(u)}$ são séries formais a serem definidas. Escreva $(G - (X^d - F)Q) = G - X^d(Q^{(0)} + Q^{(1)} + Q^{(2)} + \dots) + F(Q^{(0)} + Q^{(1)} + Q^{(2)} + \dots)$. Note que se escolhermos $Q^{(u)} \in M^u[[X]]$, então $FQ^{(u)} \in M^{u+1}[[X]]$. Portanto $Q^{(0)}$ é escolhido tal que

$\text{gr}(G - Q^{(0)}X^d) < d$, $Q^{(1)}$ escolhido tal que $\text{gr}(-Q^{(1)}X^d + FQ^{(0)}) < d$, $Q^{(2)}$ escolhido tal que $\text{gr}(-Q^{(2)}X^d + FQ^{(1)}) < d \dots$ etc. e em geral uma vez escolhido $Q^{(u)}$, definimos $Q^{(u+1)}$ via

$\text{gr}(-Q^{(u+1)}X^d + FQ^{(u)}) < d$. Assim se $Q^{(u)} = \sum_{e \geq 0} Q_e^{(u)} X^e$, temos:

$$Q_e^{(u)} = G_{d+e}, \text{ para todo } e \geq 0;$$

$$Q_e^{(u+1)} = \sum_{j=0}^{d+e} F_j Q_{d+e-j}^{(u)}, \text{ para todos } u \geq 0 \text{ e } e \geq 0;$$

Isto define sucessivamente os $Q^{(u)}$ para $u \geq 0$. Assim

$$\text{gr}[G - Q^{(0)}X^d] < d \quad \text{e} \quad \text{gr}[-Q^{(u+1)}X^d + Q^{(u)}F] < d$$

para todo $u \geq 0$. Com efeito,

$$G - Q^{(0)}X^d = (G_0 + G_1X + \dots + G_{d-1}X^{d-1} + G_dX^d) - \sum_{e \geq 0} Q_e^{(0)} X^{d+e} =$$

$$= G_0 + G_1 X + \dots + G_{d-1} X^{d-1} + G_d X^d + \dots - G_d X^d - G_{d+1} X^{d+1} - \dots = G_0 + G_1 X + \dots + G_{d-1} X^{d-1},$$

cujo grau é menor que d . Da mesma maneira considere

$$-Q^{(u+1)} X^d + Q^{(u)} F = \sum_{e \geq 0} Q_e^{(u+1)} X^{d+e} + \left(\sum_{e \geq 0} Q_e^{(u)} X^e \right) \left(\sum_{e \geq 0} F_e X^e \right).$$

O coeficiente de X^{d+e} deste polinômio é $Q_e^{(u+1)} + \sum_{j+k=d+e} Q_j^{(u)} F_k = 0$ da definição de $Q_e^{(u+1)}$, sempre que $e \geq 0$. Portanto $-Q^{(u+1)} X^d + Q^{(u)} F$ é um polinômio de grau menor que d . Feito isso observe que $Q^{(1)} \in M[[X]]$ e se $Q^{(u)} \in M^u[[X]]$ então $Q^{(u+1)} \in M^{u+1}[[X]]$, pois $F \in M[[X]]$ e isto vale para todo $u \geq 0$. Isto quer dizer que $Q_e^{(u)} \in M^u$ para todo $u \geq 0$ e todo $e \geq 0$. Assim para todo $e \geq 0$ a soma $\sum_{u \geq 0} Q_e^{(u)}$ existe em R , pois R é completo Hausdorff a respeito da topologia M -ádica, já que a sequência $(Q_e^{(0)} + Q_e^{(1)} + Q_e^{(2)} + \dots + Q_e^{(u)})_u$ é uma sequência de Cauchy. Definamos $Q_e = \sum_{u \geq 0} Q_e^{(u)}$ e $Q = \sum_{e \geq 0} Q_e X^e$. Ora Q atende a nosso objetivo, pois $(G - (X^d - F)Q)$ é um polinômio de grau menor que d :

$$G - (X^d - F)Q = \lim_{u \rightarrow \infty} (G - (X^d - F) \left(\sum_{j=0}^u Q^{(j)} \right)) = \lim_{u \rightarrow \infty} (T_u),$$

digamos, onde

$$\begin{aligned} T_{u+1} &= G - (X^d - F) \left(\sum_{j=0}^{u+1} Q^{(j)} \right) = G - X^d Q^{(0)} + F Q^{(0)} - X^d Q^{(1)} + \dots \\ &\quad + F Q^{(u)} - X^d Q^{(u+1)} + F Q^{(u+1)} \\ &= \text{um polinômio } f_{u+1} \text{ de grau menor que } d + F Q^{(u+1)}. \end{aligned}$$

Ora, a sequência (T_u) tem um limite em $R[[X]]$ donde a sequência de polinômios (f_u) é uma sequência de Cauchy. Ela ou é eventualmente constante ou tem um polinômio f de grau menor que d como limite. De qualquer modo $(G - (X^d - F)Q)$ é um polinômio de grau menor que d . Isto mostra (i).

(ii) Suponha que f e g $R[[X]]$ -associados. Então $g = \delta f$ onde δ é uma unidade em $R[[X]]$. Pela Proposição 1 $\text{gr } g = \text{gr}_w g = \text{gr}_w f = \text{gr } f$. Como f e g são mônicos (pois são distinguidos), temos $\text{gr}(f-g) < \text{gr}_w f$. Além disso podemos escrever $f-g = 0 \cdot f + (f-g) = (1-\delta)f + 0$ (duas decomposições de $f-g$ como em (i)). Pela unicidade em (i) segue-se que $f-g = 0$, isto é, $f = g$.

(iii) Se f é distinguido então $\text{gr}_w f = d < \infty$, $f_d = 1$ e $f_i = 0$ para todo $i > d$. Tome $g \in R[X]$. Por (i) existem únicos q e $r \in R[[X]]$ tais que $g = qf+r$. Por outro lado, f é também um elemento de $R[X]$ de grau d com $f_d = 1$. Pelo algoritmo Euclidiano existem únicos q' e r' em $R[X]$ (únicos) tais que $g = q'f+r'$. Da unicidade da representação em $R[[X]]$ segue-se que $q = q' \in R[X]$. Para a segunda parte, se g é também distinguido e $r = 0$ então q divide g em $R[X]$, isto é, $g = qf$ e como q é mônico (pois g e f o são) temos da Proposição 1(vi) que q é também distinguido.

(iv) $\Leftarrow f^*$ distinguido $\Leftrightarrow \text{gr}_w f^* = d < \infty$. Como f e f^* são $R[[X]]$ -associados, pela Proposição 1(iv) $\text{gr}_w f = \text{gr}_w f^* = d < \infty$ e

portanto $f \notin M[[X]]$.

$\Rightarrow$ Suponhamos agora que $f \notin M[[X]]$. $d = gr_W f < \infty$. Seja $g = X^d$ em (i). Então $X^d = qf + r$ com $gr_W r < gr_W f = d$. Afirma-
mos: $r \in M[[X]]$. Caso contrário, $gr_W r < d$. Como $X^{d-r} = qf$,

$$gr_W qf = gr_W q + gr_W f = gr_W (X^{d-r}) = gr_W r < d,$$

logo $gr_W q < 0$, um absurdo. $gr_W r$ não pode ser $\geq d$ pois $r_i = 0 \in M$ para qualquer $i \geq d$. Seja $f^* = X^{d-r}$. Então f^* é um polinômio distinguido de grau d e $f^* = X^{d-r} = qf$. Logo $gr_W f^* = d = gr_W q + gr_W f$ o que implica $gr_W q = 0$ e q é unidade.

f^* e q são unicamente determinados por f . Com efeito, se f' é outro polinômio distinguido associado a f e g uma outra unidade tais que $\delta f^* = f = gf'$, então $f^* = \delta^{-1}gf' = \delta'f'$. Por (ii) $f^* = f'$. Daí $\delta = g$.

(v) f distinguido $\Leftrightarrow gr f = gr_W f < \infty$ e f mônico. Note que nenhum $f_i \in M[[X]]$. Pela Proposição 1(i), $gr_W f = gr_W f_1 + \dots + gr_W f_s < \infty$ o que implica $gr_W f_i < \infty$ para todo $i = 1, 2, \dots, s$. Pela Proposição 1(ii), $f_i \notin M[[X]]$. Logo por (iv) f_i é associado a um polinômio distinguido f_i^* . Ora

$$gr(f_1^* \dots f_s^*) = gr f_1^* + \dots + gr f_s^* = gr_W f_1^* + \dots + gr_W f_s^* = gr_W (f_1^* \dots f_s^*).$$

Portanto $f_1^* \dots f_s^*$ é distinguido associado a $f = f_1 \dots f_s$. Por (ii) segue-se que $f = f_1^* \dots f_s^*$.

Do Teorema 1 seguem imediatamente os resultados análogos para o anel $\mathbb{Z}_p$ dos inteiros p -ádicos, sendo p um número primo ≥ 2 . São desses que precisaremos no parágrafo seguinte.

TEOREMA 2. 1) (ALGORITMO DA DIVISÃO EM $\mathbb{Z}_p[[X]]$): Se $f, g \in \mathbb{Z}_p[[X]]$ e $p \nmid f$ então existem $q \in \mathbb{Z}_p[[X]]$ e $r \in \mathbb{Z}_p[X]$ um polinômio, tais que $g = qf + r$ com $gr_r < gr_w f$. Aqui, se $n = gr_w f$, então $f = a_0 + a_1 X + \dots + a_{n-1} X^{n-1} + a_n X^n + \dots$ onde $p \nmid a_n$ e $p \mid a_i$, $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$.

2) TEOREMA p -ÁDICO DE PREPARAÇÃO DE WEIERSTRASS): Seja $f(X) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i$ onde $p \mid a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ e $p \nmid a_n$ ($n \geq 0$) tal que $gr_w f = n$. Então $f(X)$ pode ser escrito de maneira única como $f(X) = \varepsilon(X)P(X)$ onde $\varepsilon(X)$ é uma unidade de $\mathbb{Z}_p[[X]]$ e $P(X)$ é um polinômio distinguido de $\mathbb{Z}_p[X]$. $P(X) = X^n + b_{n-1} X^{n-1} + \dots + b_1 X + b_0$ onde $p \mid b_i$, $i = 0, 1, \dots, n-1$.

3) Mais geralmente, se $f(X) \in \mathbb{Z}_p[X]$ com $f \neq 0$, então f pode ser escrito de maneira única como $f(X) = p^t \varepsilon(X)P(X)$ onde $t \geq 0$ e $\varepsilon(X)$ é uma unidade de $\mathbb{Z}_p[[X]]$ e $P(X)$ é um polinômio distinguido de $\mathbb{Z}_p[X]$.

4) Mais ainda se f é um polinômio em 3) então $\varepsilon(X)$ também é um polinômio.

5) $\mathbb{Z}_p[[X]]$ é um anel fatorial cujos elementos irredutíveis são

associados de p ou de polinômios distinguidos irredutíveis.

2. ESTRUTURA DE MÓDULOS FINITAMENTE GERADOS SOBRE $\mathbb{Z}_p[[X]]$

Vamos tratar agora da estrutura de módulos finitamente gerados sobre $\mathbb{Z}_p[[X]]$. Seja $\Lambda = \mathbb{Z}_p[[X]]$ e M um Λ -módulo finitamente gerado sobre Λ . Nossa meta é descrever a estrutura de M em termos de ideais de Λ como no caso do Teorema 2 do Capítulo V. Felizmente isto é possível módulo pedaços finitos. O pseudo-isomorfismo é o mecanismo que alcança esta descrição. O Teorema 3 descreve esta estrutura.

LEMA 1: *Suponha que $f, g \in \Lambda$ são relativamente primos. Então o ideal (f, g) é de índice finito em Λ .*

DEMONSTRAÇÃO: Considere o ideal (f, g) e seja h um elemento não nulo deste ideal de menor grau. Pelo Teorema 2, existem um inteiro $\mu \geq 0$ e um polinômio distinguido H e uma unidade $U(X) \in \Lambda$ tais que $h = p^\mu U(X)H(X)$. Multiplicando-se pelo inverso de $U(X)$, pode-se supor que $h = p^\mu(X)H(X)$. (Repare que o novo $h \in (f, g)$ e o grau do novo h não muda.) Afirmamos que $H=1$: Se não, aplique o algoritmo de divisão a f e H . Assim, $f = Hq+r$, onde $\text{gr } r < \text{gr } H$ e $p^s f = p^s Hq + p^s r = hq + p^s r$ donde $p^s r \in (f, g)$ com $\text{gr } p^s r < \text{gr } h$. Logo $r = 0$ ou seja H divide f . Da mesma maneira H divide g . Mas f e g são primos entre si - uma contradição. Logo $H = 1$. Assim temos $h = p^s \in (f, g)$. Se $s = 0$,

então $(f, g) = \Lambda$ e a conclusão do Lema segue. Se $s > 0$ pode-se supor que p não divide ambos f e g ; digamos p não divide f . Portanto $f = U_1(X)f_1(X)$ onde f_1 é um polinômio distinguido. Multiplicando-se ainda pelo inverso de $U_1(X)$, pode-se supor que f é distinguido. Assim $(p^s, f) \subseteq (f, g)$. Ora (p^s, f) é um ideal de índice finito:

$$\frac{\Lambda}{(p^s, f)} \cong \mathbb{Z}_p[[X]]/(f) \cong \frac{\mathbb{Z}_p[[X]]/(f)}{(\bar{p})^s}$$

Ora pelo algoritmo de divisão todo elemento de Λ é congruente módulo f a um polinômio de grau menor que o de f . Se passamos agora módulo $(\bar{p})^s$, então um conjunto de representantes de $\frac{\mathbb{Z}_p[[X]]}{(f)} / (\bar{p})^s$ consiste de $\{\bar{a}_0 + \bar{a}_1\bar{X} + \bar{a}_2\bar{X}^2 + \dots + \bar{a}_{m-1}\bar{X}^{m-1}\}$ onde $m = \text{gr } f$ e $\bar{a}_i \in \mathbb{Z}_p / (\bar{p})^s \cong \frac{\mathbb{Z}}{(p^s)}$. Assim o índice de $\frac{\Lambda}{(f, p^s)}$ é p^{sm} , que é finito. Como $(f, p^s) \subseteq (f, g)$ segue que (f, g) é de índice finito.

LEMA 2: Suponha que $f, g \in \Lambda$ são elementos primos entre si. Então

(i) A aplicação natural $\Lambda/(fg) \rightarrow \Lambda/(f) \oplus \Lambda/(g)$ definida por $\bar{c} \mapsto (\bar{c}, \bar{c})$ onde $c \in \Lambda$ e barra indica classe módulo é uma injeção, cujo Cokernel é finito.

(ii) Existe uma injeção $\Lambda/(f) \oplus \Lambda/(g) \rightarrow \Lambda/(fg)$ cujo Cokernel é finito.

DEMONSTRAÇÃO: (i) A aplicação natural $\theta : \bar{c} \rightarrow (\bar{c}, \bar{c})$ é uma injeção pois $\theta(\bar{c}) = 0$ se e somente se f e g dividem c . Como f e g são primos entre si e Λ é um domínio fatorial, segue que $fg|c$ e logo $\bar{c} = 0$. Portanto θ é uma injeção. Para a segunda afirmativa de (i), primeiro mostremos que se $I = (f, g)$ o ideal gerado por f e g em Λ , e $(a, b) \in \Lambda \times \Lambda$. Então $(\bar{a}, \bar{b}) \in \text{Im } \theta$ se e somente se $a-b \in I$. Seja $a-b \in I$. Escreva $a-b = Af+Bg$ com $A, B \in \Lambda$. Então $a-Af = b+Bg = c$, digamos e evidentemente

$$\theta(\bar{c}) = \theta(\overline{a-Af}) = \theta(\overline{b+Bg}) = (\overline{a-Af}, \overline{b+Bg}) \in \frac{\Lambda}{(f)} \times \frac{\Lambda}{(g)} = (\bar{a}, \bar{b}).$$

Reciprocamente, se $(\bar{a}, \bar{b}) = \theta(\bar{c})$, então $c-a = fA$ e $c-b = gB$ para algum $A, B \in \Lambda$. Daí $c = a+fA = b+gB$ e $a-b \in I$. Ora pelo Lema 1, $\frac{\Lambda}{(f, g)}$ é finito. Sejam $r_1, r_2, \dots, r_n \in \Lambda$ um sistema completo de representantes de classes módulo (f, g) de Λ . Então $\{(\bar{0}, \bar{r}_i)\}_{1 \leq i \leq n}$ é um sistema completo de representantes de Cokernel de θ . Com efeito, se $(\bar{a}, \bar{b}) \in \frac{\Lambda}{(f)} \times \frac{\Lambda}{(g)}$, seja $r_i \in \Lambda$ tal que $a-b \equiv -r_i \pmod{(f, g)}$. Então pela nossa afirmação anterior, $(\bar{a}, \overline{b-r_i}) \in \text{Im } \theta$ ou seja $(\bar{a}, \bar{b}) \equiv (\bar{0}, \bar{r}_i) \pmod{\text{Im } \theta}$ em $\frac{\Lambda}{(f)} \times \frac{\Lambda}{(g)}$. Por outro lado, $(\bar{0}, \bar{r}_i) \not\equiv (\bar{0}, \bar{r}_j) \pmod{\text{Im } \theta}$ se $i \neq j$, pois $(\bar{0}, \bar{r}_i) \equiv (\bar{0}, \bar{r}_j) \pmod{\text{Cokernel } \theta}$ se e somente se $(\bar{0}, \overline{r_i-r_j}) \in \text{Im } \theta$. Isto é possível se e somente se $r_i-r_j \in I$ o que não é possível se $i \neq j$. Assim θ é uma aplicação cujo Cokernel é finito.

(ii) Pela primeira parte se $M = \theta\left(\frac{\Lambda}{(fg)}\right)$ e $N = \frac{\Lambda}{(f)} \oplus \frac{\Lambda}{(g)}$, en-

tão $M \subseteq N$ e $M \simeq \frac{\Lambda}{(fg)}$; também N/M é finito. Seja P um polinômio distinguido (não-constante) relativamente primo em relação a fg . Mostramos que existe um inteiro positivo k tal que a multiplicação por P^k define uma injeção $N \xrightarrow{P^k} M$ cujo Cokernel é finito.

Seja $(\bar{x}, \bar{y}) \in N$. Como N/M é finito e $\{P^i(\bar{x}, \bar{y})\}_{i=0}^{\infty} \subseteq N$, existem inteiros $0 \leq i < j$ tais que $P^i(\bar{x}, \bar{y}) \equiv P^j(\bar{x}, \bar{y}) \pmod{M}$ ou seja $(1-P^{j-i})P^i(\bar{x}, \bar{y}) \in M$. Mas $1-P^{j-i}$ é uma unidade de Λ , pois $j \neq i$ e portanto P^{j-i} é um polinômio distinguido não-constante. Assim $P^i(\bar{x}, \bar{y}) \in M$. Ora, N é um Λ -módulo finitamente gerado por $(\bar{1}, \bar{0})$ e $(\bar{0}, \bar{1})$. Portanto existe um inteiro $k \geq 0$ tal que $P^k(\bar{1}, \bar{0}) \in M$ e $P^k(\bar{0}, \bar{1}) \in M$ donde $P^k N \subseteq M$. Assim

$\varphi : N \xrightarrow{P^k} M$ é uma aplicação de N em M . φ é injetiva, pois se $P^k(\bar{x}, \bar{y}) = 0$ em M então f divide $P^k x$ e g divide $P^k y$; como P e fg são primos entre si, f divide x e g divide y ou seja $(\bar{x}, \bar{y}) = (\bar{0}, \bar{0})$. Daí φ é injetiva. O composto de φ com

o isomorfismo $M \simeq \frac{\Lambda}{(fg)}$ define a desejada injeção $\psi : \frac{\Lambda}{(f)} \times \frac{\Lambda}{(g)} \rightarrow \frac{\Lambda}{(fg)}$. Ora $\psi(\bar{1}, \bar{1}) = \overline{P^k}$. Portanto se $J = (P^k, fg)$ o ideal gerado por P^k e fg em Λ , então $\bar{J} \subseteq \text{Im } \psi \subseteq \frac{\Lambda}{(fg)}$. Ora, $\text{Coker } \psi = \frac{\Lambda/(fg)}{\text{Im } \psi}$ é uma imagem homomórfica de $\frac{\Lambda/(fg)}{\bar{J}} \simeq \frac{\Lambda}{J}$ e $\frac{\Lambda}{J}$ é finito pelo Lema 1 pois fg e P^k são primos entre si. Portanto $\text{Coker } \psi$ também é finito.

DEFINIÇÃO: Dizemos que dois Λ -módulos de M e M' são pseudo-

isomorfos e denotados por $M \sim M'$, se existe um homomorfismo $M \rightarrow M'$ com núcleo e co-núcleo finitos.

A composição de dois pseudo-isomorfismos é um pseudo-isomorfismo.

Em termos desta definição, o Lema 2 afirma que $\frac{\Lambda}{(f)} \times \frac{\Lambda}{(g)} \sim \frac{\Lambda}{(fg)}$ e $\frac{\Lambda}{(fg)} \sim \frac{\Lambda}{(f)} \times \frac{\Lambda}{(g)}$ se f, g são primos entre si. Cabe observar que em geral $\sim$ não é uma relação de equivalência; se $M \sim M'$ não decorre que $M' \sim M$!

Nossa meta é descrever a estrutura de módulos finitamente gerados sobre o anel $\mathbb{Z}_p[[X]]$. Este teorema foi primeiramente demonstrado por Iwasawa. Existe uma prova de Serre que usa o fato de que nosso anel $\mathbb{Z}_p[[X]]$ é um domínio noetheriano de Krull de dimensão 2 e usa a teoria de divisores (Ver Bourbaki, N., Algèbre Commutative, Chap. 7, Diviseurs: Hermann, Paris, 1965).

Nossa prova é baseada no livro de Lang [6], onde ele dá uma prova matricial. Esta abordagem é baseada no espírito do Capítulo V, que serve de modelo. Além de operações que ali comparecem, entram mais 3 operações aqui, uma vez que o Teorema da estrutura em questão trata de pseudo-isomorfismo e não de isomorfismo. Isto quer dizer que o módulo em questão é descrito via um homomorfismo $\theta : M \rightarrow M'$ onde M' tem uma estrutura simples como no Capítulo V, e onde $\ker \theta$ e $\text{coker } \theta$ são finitos. Portanto a informação é módulo dois pedaços finitos.

Mais uma vez a custo de repetição desenvolvemos a filosofia

que está atrás da abordagem matricial.

Seja M um módulo finitamente gerado sobre A com geradores $u_1, \dots, u_n$. Então existe um homomorfismo sobrejetor θ do A -módulo A^n em M tal que $\theta(y_i) = u_i$ para todo $i = 1, \dots, n$ onde $y_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, y_n = (0, \dots, 0, 1)$. Seja $K = \ker \theta$. Pelo Teorema Fundamental do Isomorfismo, $M \cong A^n/K$. Como K é submódulo do A -módulo A^n e A é Noetheriano, K é finitamente gerado (Lang [5]). Sejam $\lambda_1 = (\lambda_{11}, \dots, \lambda_{1n}), \dots, \lambda_m = (\lambda_{m1}, \dots, \lambda_{mn})$ os geradores de K . Então M pode ser representado pela matriz $m \times n$

$$F = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \cdots & \lambda_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_{m1} & \cdots & \lambda_{mn} \end{bmatrix} .$$

Como cada linha dessa matriz é um elemento do núcleo do homomorfismo θ , temos que para todo $i = 1, \dots, m$

$$\theta(\lambda_{i1} u_1 + \dots + \lambda_{in} u_n) = 0$$

isto é,

$$(*) \quad \lambda_{i1} u_1 + \dots + \lambda_{in} u_n = 0 .$$

Assim $M = [u_1, \dots, u_n]$ é determinado pela matriz $F = [\lambda_{ij}]_{m \times n}$ e relações (*). Aqui a matriz F é também chamada de matriz de

relações do módulo M . Desse modo, um módulo finitamente gerado sobre A é determinado por uma matriz de relações.

Procuraremos, como no capítulo anterior, um conjunto de geradores e um conjunto de relações as mais simples possíveis.

Vejamos a seguir as operações básicas permitidas com linhas e colunas. Primeiro aquelas que correspondem a mudar geradores de F e M que foram usadas para $k[X]$.

OPERAÇÃO A: *Podemos permutar linhas ou permutar colunas.*

OPERAÇÃO B: *Podemos somar a uma linha (ou coluna) um múltiplo de outra linha (ou coluna). Em particular, se $\lambda' = q\lambda + r$ então*

$$\begin{bmatrix} \vdots & & \vdots & & \\ \lambda & \dots & r & \dots & \\ \vdots & & \vdots & & \end{bmatrix} \xrightarrow{c_r + qc_1} \begin{bmatrix} \vdots & & \vdots & & \\ \lambda & \dots & \lambda' & \dots & \\ \vdots & & \vdots & & \end{bmatrix} .$$

OPERAÇÃO C: *Podemos multiplicar uma linha ou coluna por um elemento unidade de A .*

Agora as operações adicionais onde entram os pseudo-isomorfismos:

OPERAÇÃO I: *Se F contém uma linha $(\lambda_{11}, p\lambda_{12}, \dots, p\lambda_{1n})$ com*

$$\theta(m) = \left[a_1(\vec{r}_1, 0) + a_2(\vec{r}_2, 0) + \dots + a_m(\vec{r}_m, 0) + \right. \\ \left. + a(-1, 0, \dots, 0, p) + b(0, \lambda_{12}, \dots, \lambda_{1n}, \lambda_{11}) \right] \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \\ v \end{bmatrix} .$$

Isto é simplesmente uma maneira de dizer que $\theta(m)$ pertence ao módulo de relações K' definindo M' e dado por (*) e (***) . Os geradores de K' são as linhas da matriz

$$\begin{bmatrix} (\vec{r}_1, 0) \\ \vdots \\ (\vec{r}_m, 0) \\ (-1, 0, \dots, 0, p) \\ (0, \lambda_{12}, \dots, \lambda_{1n}, \lambda_{11}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & p\lambda_{12} & \dots & p\lambda_{1n} & 0 \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \dots & \lambda_{2n} & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \dots & \lambda_{mn} & 0 \\ -1 & 0 & \dots & 0 & p \\ 0 & \lambda_{12} & \dots & \lambda_{1n} & \lambda_{11} \end{bmatrix} .$$

Logo o vetor $\theta(m)$ é uma combinação linear das linhas dessa última matriz. Ora se $m = \mu_1 u_1 + \dots + \mu_n u_n$, então $\theta(m) = \mu_1 v_1 + \dots + \mu_n v_n$. Logo

$$(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n, 0) = a_1(\vec{r}_1, 0) + a_2(\vec{r}_2, 0) + \dots + a_m(\vec{r}_m, 0) + \\ + a(-1, 0, \dots, 0, p) + b(0, \lambda_{12}, \dots, \lambda_{1n}, \lambda_{11}) .$$

Comparando-se os últimos componentes $0 = ap + b\lambda_{11}$. Como $p \nmid \lambda_{11}$, $p \mid b$ e $\lambda_{11} \mid a$. Daí $-\frac{a}{\lambda_{11}} = \frac{b}{p} = c \in \Lambda$. Substituindo-se $-a = c\lambda_{11}$ e $b = cp$ temos

$$\begin{aligned} (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n) &= (a_1 \vec{r}_1 + a_2 \vec{r}_2 + \dots + a_m \vec{r}_m + \\ &+ \underbrace{c(\lambda_{11}, 0, \dots, 0)}_{n \text{ entradas}} + c(0, p\lambda_{12}, p\lambda_{13}, \dots, p\lambda_{1n}) \\ &= a_1 r_1 + a_2 r_2 + \dots + a_m r_m + c r_1 \quad (\text{repare que os} \\ &\quad r_i \text{ são vetores com } n \text{ entradas}) \\ &= (a_1 + c) \vec{r}_1 + a_2 \vec{r}_2 + \dots + a_m \vec{r}_m. \end{aligned}$$

Isto mostra que $(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$ é uma combinação linear de linhas da matriz F que é a matriz de relações de M . Logo $m = \mu_1 u_1 + \mu_2 u_2 + \dots + \mu_n u_n$ pertence a K , o módulo de relações de M . Logo $m = 0$ em M . Daí $\theta : M \rightarrow M'$ é uma injeção. Portanto $\ker \theta = (0)$ é finito.

Vamos mostrar que $\text{coker } \theta$ é finito.

Primeiro observe que $-v_1 + pv = 0$ e $\lambda_{12} v_2 + \dots + \lambda_{1n} v_n + \lambda_{11} v = 0$ e $\theta(M) = [v_1, \dots, v_n]$ (gerado por v_i). Logo $pM' \subseteq \theta(M)$ pois $(pv_i) \subseteq \theta(M)$ e $(pv) \subseteq \theta(M)$. Da mesma maneira $\lambda_{11} M' \subseteq \theta(M)$. Portanto $\frac{M'}{\theta(M)}$ é anulado pelo ideal (p, λ_{11}) . Ora p e λ_{11} são primos entre si e portanto $\frac{\Lambda}{(p, \lambda_{11})}$ é finito pelo Lema 1. M' é

um módulo finitamente gerado sobre Λ por $v_1, v_2, \dots, v_n$ e v , e portanto $\frac{M'}{\theta(M)}$ é finitamente gerado sobre $\frac{\Lambda}{(p, \lambda_{11})}$ por $\bar{v}$. Como $\frac{\Lambda}{(p, \lambda_{11})}$ é finito, então $\frac{M'}{\theta(M)} = \frac{\Lambda}{(p, \lambda_{11})} \bar{v}$ é finito. Logo coker θ é finito. Assim θ é um pseudo-isomorfismo.

Vamos mostrar agora que a matriz de relações M' pode ser dada pela matriz $m \times n$ F' .

Ora $M' = [v_1, v_2, \dots, v_n, v]$ com relações (*) e $(n+1)$ geradores)

$$(***) \quad \begin{cases} -v_1 + pv = 0 \\ \lambda_{12}v_2 + \dots + \lambda_{1n}v_n + \lambda_{11}v = 0 \end{cases}$$

Logo $M' = [v_2, v_3, \dots, v_n, v] = [v, v_2, v_3, \dots, v_n]$ (n) geradores)

A primeira linha de (*) dá

$$\lambda_{11}v_1 + p\lambda_{12}v_2 + \dots + p\lambda_{1n}v_n = 0.$$

Mas $v_1 = pv$ dá

$$p(\lambda_{11}v + \lambda_{12}v_2 + \dots + \lambda_{1n}v_n) = 0.$$

Esta relação já está incluída na 2ª relação de (***) . Portanto podemos tomar a primeira linha da matriz de relações de M' como $(\lambda_{11}, \lambda_{12}, \dots, \lambda_{1n})$. Como $v_1 = pv$, as outras linhas de (*) são as mesmas linhas correspondentes de F com os elementos da primeira

coluna multiplicados por p . Por exemplo,

$$\lambda_{21}v_1 + \lambda_{22}v_2 + \dots + \lambda_{2n}v_n = 0$$

se torna

$$p\lambda_{21}v_1 + \lambda_{22}v_2 + \dots + \lambda_{2n}v_n = 0,$$

dando

$$(p\lambda_{21}, \lambda_{22}, \dots, \lambda_{2n}).$$

Logo F' pode ser tomada como matriz de relações de M' . $\square$

OPERAÇÃO II: Se todos os elementos da primeira coluna de F são divisíveis por p^k e se a primeira linha $p^k\lambda_{11}, \dots, p^k\lambda_{1n}$ com $p^k\lambda_{11}$, então podemos mudar para a matriz $\begin{bmatrix} F' & 0 \\ 0 & p^k \end{bmatrix}$ onde F' é obtida de F por substituição da primeira linha $(p^k\lambda_{11}, \dots, p^k\lambda_{1n})$ por $(\lambda_{11}, \dots, \lambda_{1n})$. Isto é,

$$F = \begin{bmatrix} p^k\lambda_{11} & p^k\lambda_{12} & \dots & p^k\lambda_{1n} \\ p^k\lambda_{21} & \lambda_{22} & \dots & \lambda_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p^k\lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \dots & \lambda_{mn} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \dots & \lambda_{1n} & 0 \\ p^k\lambda_{21} & \lambda_{22} & \dots & \lambda_{2n} & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ p^k\lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \dots & \lambda_{mn} & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & p^k \end{bmatrix}$$

DEMONSTRAÇÃO da justificativa da Operação II: Seja M gerado por $u_1, u_2, \dots, u_n$ e seja F a matriz de relações de M . Seja M' gerado por $v_1, v_2, \dots, v_n$ e v onde G' , a matriz de M' é

$$G' = \left[\begin{array}{cccc|c} F & & & & 0 \\ \hline p^k & 0, \dots & & & -p^k \\ 0 & \lambda_{12} & \lambda_{13} & \dots & \lambda_{1n} & \lambda_{11} \end{array} \right].$$

Isto é, $v_1, \dots, v_n$ satisfazem as mesmas relações que $u_1, u_2, \dots, u_n$ na matriz F e, além disso,

$$(***) \quad \begin{cases} p^k v_1 - p^k v = 0 \\ \lambda_{12} v_2 + \lambda_{13} v_3 + \dots + \lambda_{1n} v_n + \lambda_{11} v = 0. \end{cases}$$

Como no caso da Operação I, definimos um homomorfismo $\theta : M \rightarrow M'$ por $\theta(u_i) = v_i$, $i = 1, 2, \dots, n$. θ é bem definido pois F faz parte de G' .

Afirmamos que θ é novamente uma injeção. De fato, seja $m = \mu_1 u_1 + \dots + \mu_n u_n \in M$ tal que $\theta(m) = \mu_1 v_1 + \dots + \mu_n v_n = 0$ em M' . Logo $(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n, 0)$ é uma combinação linear de $(\vec{r}_1, 0), (\vec{r}_2, 0), \dots, (\vec{r}_m, 0), (p^k, 0, \dots, 0, -p^k)$ e $(0, \lambda_{12}, \lambda_{13}, \dots, \lambda_{1n}, \lambda_{11})$, onde r_i é a i -ésima linha de F ; isto porque $(\mu_1, \dots, \mu_n, 0)$ pertence ao módulo de relações K' de M' gerado pelas linhas de G' .

Logo existem escalares $a_1, a_2, \dots, a_m$, a e $b \in \Lambda$ tais que

$$(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n, 0) = a_1(\vec{r}_1, 0) + a_2(\vec{r}_2, 0) + \dots + a_m(\vec{r}_m, 0) + \\ + a(p^k, 0, \dots, 0, -p^k) + b(0, \lambda_{12}, \dots, \lambda_{1n}, \lambda_{11}) .$$

Daí, $0 = -ap^k + b\lambda_{11}$. Ora $p \nmid \lambda_{11} \Rightarrow p^k \mid b$ e $\lambda_{11} \mid a$. Logo

$$\frac{a}{\lambda_{11}} = \frac{b}{p^k} = c \in \Lambda, \text{ donde}$$

$$(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n) = a_1\vec{r}_1 + a_2\vec{r}_2 + \dots + a_m\vec{r}_m + \\ + c\lambda_{11}(p^k, 0, \dots, 0) + p^k c(0, \lambda_{12}, \dots, \lambda_{1n}) \\ = (a_1 + c)\vec{r}_1 + a_2\vec{r}_2 + \dots + a_m\vec{r}_m .$$

Portanto $(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$ é uma combinação linear das linhas da matriz de relações F . Isto implica em $m = \mu_1 u_1 + \dots + \mu_n u_n = 0$ em M . Logo θ é injetora e $\ker \theta = (0)$.

Mostremos que $\text{coker } \theta$ é finito. Ora $\theta(M) = [v_1, v_2, \dots, v_n] \subseteq M'$. Logo $\frac{M'}{\theta(M)}$ é gerado por $\bar{v}$. Repare que $(p^k v) = (p^k v_1) \subseteq \theta(M)$ e $(p^k v_i) \subseteq \theta(M)$. Logo $p^k M' \subseteq \theta(M)$. Da mesma maneira $\lambda_{11} M' \subseteq \theta(M)$. Portanto $\frac{M'}{\theta(M)}$ é anulado por (p^k, λ_{11}) donde ele é um $\frac{\Lambda}{(p^k, \lambda_{11})}$ - módulo gerado por $\bar{v}$. Ora, pelo Lema 1, $\frac{\Lambda}{(p^k, \lambda_{11})}$ é finito e portanto $\frac{M'}{\theta(M)} = \frac{\Lambda}{(p^k, \lambda_{11})} \bar{v}$ também é finito. Logo, $\text{coker } \theta$ é finito e θ é um pseudo-isomorfismo.

Para conseguir a matriz F' como relações, consideramos M''

o submódulo de M' gerado por $v, v_2, \dots, v_n$ e M''' o submódulo de M' gerado por $v_1 - v$. Evidentemente $M' = M'' + M'''$.

Afirmamos que $M'' \cap M''' = (0)$. De fato, se $av + a_2v_2 + \dots + a_nv_n = b(v_1 - v)$ com $a, b, a_i \in \Lambda$, então $(a+b)v - bv_1 + a_2v_2 + \dots + a_nv_n = 0$ em M' . Daí $\beta = (-b, a_2, \dots, a_n, a+b)$ pertence ao módulo de relações de M' . Ora, a primeira coluna de F e de G' são divisíveis por p^k . Como β pertence ao subespaço gerado pelas linhas de G' , tem a sua primeira entrada divisível por p^k . Daí $p^k \mid (-b)$, digamos $-b = p^k c$. Então $b(v_1 - v) = -cp^k(v_1 - v) = 0$ em M' . Logo $av + a_2v_2 + \dots + a_nv_n = b(v_1 - v) = 0$ e $M'' \cap M''' = (0)$. Portanto $M' = M'' \oplus M'''$.

Seja $M' \varphi M''$ a projeção $\ker \varphi = M''' = \Lambda(v_1 - v)$. Como $p^k(v_1 - v) = 0$, M'' é anulado por p^k e logo M''' é um $\frac{\Lambda}{(p^k)}$ -módulo. Mas o anulador de M''' é (p^k) pois se $f(v_1 - v) = 0$ então $(f, 0, \dots, 0, -f)$ pertence ao módulo de relações K' de M' e daí a primeira entrada é divisível por p^k . Isto mostra que $M''' \cong \frac{\Lambda}{(p^k)}$. A matriz de relações de M' pode ser obtida de matrizes de relações G'' e G''' de M'' e M''' , respectivamente. G'' é obtida de relações de $v, v_2, v_3, \dots, v_n$ e de G''' de relações de $v_1 - v$. Portanto

$$G'' = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1n} \\ p^{k\lambda_{21}} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p^{k\lambda_{m1}} & \lambda_{m2} & \cdots & \lambda_{mn} \end{bmatrix}$$

tais que $\lambda_{11}v_1 + \lambda_{12}v_2 + \dots + \lambda_{1n}v_n = 0$, $p^{k\lambda_{21}}v_1 + \lambda_{22}v_2 + \dots + \lambda_{2n}v_n = 0$, etc. (repare que $p^{k\lambda_{12}}v_1 = p^{k\lambda_{12}}v_1$) e $G''' = [p^k]$, uma matriz 1×1 . Portanto a matriz de relações de M' é

$$\begin{bmatrix} G'' & 0 \\ 0 & G''' \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cccc|c} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1n} & \\ p^{k\lambda_{21}} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2n} & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \\ p^{k\lambda_{m1}} & \lambda_{m2} & \cdots & \lambda_{mn} & \\ \hline & 0 & & & p^k \end{array} \right] = F'$$

como desejamos.

OPERAÇÃO III: Se F contém a primeira linha $(p^{k\lambda_{11}}, \dots, p^{k\lambda_{1n}})$ e para algum λ com $p \nmid \lambda$, $(\lambda\lambda_{11}, \dots, \lambda\lambda_{1n})$ é uma relação (não necessariamente contida em F de maneira explícita), então podemos mudar de F para F' onde F' é obtida de F por substituição de $(p^{k\lambda_{11}}, \dots, p^{k\lambda_{1n}})$ por $(\lambda_{11}, \dots, \lambda_{1n})$.

DEMONSTRAÇÃO da justificativa da Operação III: Seja M gerado por $u_1, u_2, \dots, u_n$ e a matriz de relações

$$F = \begin{bmatrix} p^k \lambda_{11} & p^k \lambda_{12} & \dots & p^k \lambda_{1n} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \dots & \lambda_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \dots & \lambda_{mn} \end{bmatrix}$$

Seja M' um módulo gerado por $v_1, v_2, \dots, v_n$ e seja G a matriz de relações de M' definida por

$$G = \begin{bmatrix} F \\ \lambda_{11} \dots \lambda_{1n} \end{bmatrix}$$

uma matriz $(m+1) \times n$. Existe um homomorfismo $\theta : M \rightarrow M'$ definido por $\theta(u_i) = v_i$. θ é bem definido pois os v_i satisfazem as mesmas relações que os u_i . É evidente que θ é sobrejetor, logo $\text{coker } \theta = (0)$.

Afirmamos que $\text{coker } \theta$ é anulado pelo ideal (λ, p^k) de A . Com efeito, se $x = a_1 u_1 + \dots + a_n u_n$ está no $\ker \theta$ então $a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = 0$ e $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in K'$, o submódulo de relações gerado pelas linhas de G . Logo

$$(a_1, \dots, a_n) = t_1 \vec{r}_1 + t_2 \vec{r}_2 + \dots + t_n \vec{r}_n + t(\lambda_{11}, \lambda_{12}, \dots, \lambda_{1n})$$

onde os r_i são as linhas de F . Portanto em M

$$x = a_1 u_1 + \dots + a_n u_n = t(\lambda_{11} u_1 + \lambda_{12} u_2 + \dots + \lambda_{1n} u_n)$$

Daí $\lambda x = 0$, pois $(\lambda \lambda_{11}, \lambda \lambda_{12}, \dots, \lambda \lambda_{1n})$ é também uma relação de M . Da mesma maneira $p^k x = 0$ pois $(p^k \lambda_{11}, p^k \lambda_{12}, \dots, p^k \lambda_{1n})$ é uma relação de M . Daí (p^k, λ) anula $\ker \theta$ e $\ker \theta$ é um $\frac{\Lambda}{(p^k, \lambda)}$ -módulo.

Ora, $\ker \theta \subseteq M$ e M é finitamente gerado. Como Λ é noetheriano, $\ker \theta$ é finitamente gerado, digamos por $y_1, y_2, \dots, y_s$. Portanto $\ker \theta$ é gerado por $y_1, \dots, y_s$ como $\frac{\Lambda}{(p^k, \lambda)}$ -módulo também. Então $\ker \theta$ é uma imagem homomórfica como $\frac{\Lambda}{(p^k, \lambda)}$ -módulo de $(\frac{\Lambda}{(p^k, \lambda)})^s$. Esse último módulo é finito pois $\frac{\Lambda}{(p^k, \lambda)}$ é finito pelo Lema 1. Portanto $\ker \theta$ é finito, sendo uma imagem homomórfica de $(\frac{\Lambda}{(p^k, \lambda)})^s$. Isto mostra que θ é um pseudo-isomorfismo.

A matriz de relações de M' pode ser tomada como

$$\begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \dots & \lambda_{1n} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \dots & \lambda_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \dots & \lambda_{mn} \end{bmatrix}$$

substituindo-se a primeira linha de F pela última linha de G .

Dadas essas operações, a estrutura de um $\mathbb{Z}_p[[X]]$ -módulo M finitamente gerado pode ser expressa da seguinte maneira:

TEOREMA 3: *Seja M um Λ -módulo finitamente gerado. Então existe um pseudo-isomorfismo $\theta : M \rightarrow M'$ onde*

$$M' = \Lambda^r \oplus \left(\begin{array}{c} s \\ \oplus \\ i=1 \end{array} \frac{\Lambda}{(p \ i)} \right) \oplus \left(\begin{array}{c} t \\ \oplus \\ j=1 \end{array} \frac{\Lambda}{(f_j(X))^{m_j}} \right)$$

com $r \geq 0$, $s \geq 0$, $t \geq 0$, $n_i > 0$ (se $s > 0$) e $m_j > 0$ (se $t > 0$) e os $f_j(X)$ são polinômios distinguidos e irredutíveis.

DEMONSTRAÇÃO: Procedemos da mesma maneira que na demonstração do Teorema 2 do Capítulo V seguindo o espírito da prova do Teorema 1 daquele capítulo. O módulo M é dado por geradores $u_1, u_2, \dots, u_n$ e uma matriz de relações F . Pode-se mudar de F para uma matriz F' usando um número finito de operações do tipo A, B, C, I, II e III. F' define um novo módulo M' tal que $M \sim M'$ (composição de dois pseudo isomorfismos é um pseudo-isomorfismo). A meta é efetuar as operações indicadas de tal maneira que a matriz F' tenha uma forma simples.

Dizemos que $F \sim F'$ se F' é obtida de F via um número finito de operações. Observe que se F é uma matriz $m \times n$, então

$$F' \sim G = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \dots & \lambda_{1n} & 0 \\ p^k \lambda_{21} & & & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \\ p^k \lambda_{m1} & & & & \\ 0 & & & & p^k \end{bmatrix}$$

e pelo suposto p divide todas as entradas de F' enquanto $p \nmid \lambda_{11}$ - uma contradição.

Assim existe uma matriz G tal que $F \sim G$ e p não divide todas as entradas de G e portanto podemos falar no grau de Weierstrass finito de entradas não nulas de G . Então pegamos uma matriz G tal que $F \sim G$ e G possui uma entrada não-nula cujo grau de Weierstrass é o menor possível entre os graus de Weierstrass de entradas não-nulas de matrizes F' com $F \sim F'$. Via operações do tipo A sobre G , podemos supor

$$F \sim \begin{bmatrix} \lambda_{11} = \lambda & \lambda_{12} & \dots & \lambda_{1n} & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \\ \lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \dots & \lambda_{mn} & 0 \\ 0 & 0 & & 0 & p^{k_1} \end{bmatrix}$$

onde a última linha e a última coluna podem deixar de existir. Elas só aparecem

se a Operação II tiver sido usada na transição de F para G. Ora, λ_{11} admite uma fatoração $\lambda_{11} = \varepsilon_{11}(X)\mu_{11}(X)$ onde $\varepsilon_{11}(X)$ é uma unidade de Λ e μ_{11} um polinômio distinguido. Via Operação C, multiplicando-se a primeira linha da última matriz por ε_{11}^{-1} , temos

$$F \sim \begin{array}{c} * \\ \left[\begin{array}{ccccc} \mu_{11} & \lambda_{12} & \dots & \lambda_{1n} & 0 \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \dots & \lambda_{2n} & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \dots & \lambda_{mn} & 0 \\ * & 0 & 0 & \dots & 0 \end{array} \right] \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ p^{k_1} \end{array} \end{array}$$

onde μ_{11} é um polinômio distinguido. Aplicando-se o algoritmo da divisão de λ_{1j} por λ_{11} , temos $\lambda_{1j} = q_{1j}\lambda_{11} + r_{1j}$ onde $r_{1j} \in \mathbb{Z}_p[X]$ e $q_{1j} \in \Lambda$.

Via operações do tipo B (somando-se q_{1j} vezes a primeira coluna à j-ésima coluna da última matriz tem-se

(*) Indica que aquela linha e aquela coluna podem ou não aparecer.

$$F \sim \begin{bmatrix} \mu_{11} & r_{12} & r_{13} & \dots & r_{1n} & 0 \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \lambda_{23} & \dots & \lambda_{2n} & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \lambda_{m3} & \dots & \lambda_{mn} & 0 \\ * & 0 & 0 & \dots & 0 & p^k \end{bmatrix}$$

Afirmamos que os $r_{1j} = 0$. Primeiro observamos que $gr_w r_{1j} = \infty$, ou seja, p divide os coeficientes de r_{1j} , $\forall j$. Isto vale pois caso contrário

$$gr_w r_{1j} \leq gr r_{1j} < gr \mu_{11} = gr_w \lambda_{11} = gr_w \lambda,$$

contrariando a escolha de λ . Portanto p divide os coeficientes de r_{1j} . Existe um inteiro $t \geq 1$ tal que p^t divide os r_{1j} , mas $p^{t+1} \nmid r_{1j}$ para todo j , digamos $p^{t+1} \nmid r_{1s}$, $2 \leq s \leq n$. Assim

$$F \sim \begin{bmatrix} \mu_{11} & p^t x_{12} & p^t x_{13} & \dots & p^t x_{1s} & \dots & p^t x_{1n} & 0 \\ \dots & \dots \end{bmatrix}$$

onde $p \nmid \mu_{11}$. Usando operações do tipo I sucessivamente, temos

existe $t \geq 1$ tal que $p^t | \lambda_{11}$ e $p^{t+1} \nmid \lambda_{s1}$ digamos com $2 \leq s \leq n$. Se $\lambda_{s1} = p^t y_{s1}$ então $(p^t y_{s1}, 0, \dots, 0)$ é uma relação e evidentemente $(\lambda_{11} y_{s1}, 0, \dots, 0)$ é uma relação multiplicando-se a primeira linha por y_{s1} . Pelas Operações A e III e observando o fato de $p \nmid \lambda_{11}$ concluimos que $(y_{s1}, 0, \dots, 0)$ é uma relação. Ora $p \nmid y_{s1}$ e $\text{gr}_w y_{s1} \leq \text{gr } y_{s1} = \text{gr } \lambda_{s1} < \text{gr } \lambda_{11} = \text{gr}_w \lambda_{11}$, contrariando a escolha de λ_{11} . Logo se $B = 0$ então $\lambda_{j1} = 0, \forall j = 2, \dots, n$ e

$$F \sim \begin{bmatrix} \lambda_{11} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ * & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} * \\ \\ \\ p^{k_1} \end{matrix}$$

donde $M \sim \Lambda^{n-1} \oplus \frac{\Lambda}{(\lambda_{11})} \oplus \frac{\Lambda}{(p^{k_1})}$.

O caso de $B \neq 0$ vai depender dos seguintes lemas:

LEMA 3: Se

$$F = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda \lambda_{12} & \lambda \lambda_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

e λ e λ_{11} são primos entre si, então $F \sim F'$ onde

$$F' = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \dots & \lambda_{1n} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \dots & \lambda_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \dots & \lambda_{mn} \end{bmatrix}$$

DEMONSTRAÇÃO: Seja M um Λ -módulo definido por F . Sejam $M = \Lambda u_1 + \dots + \Lambda u_n$ e $M' = \Lambda v_1 + \dots + \Lambda v_n + \Lambda v$ onde os v_i satisfazem as mesmas relações que os u_i (*) e

$$(***) \begin{cases} -v_1 + \lambda_{11} v = 0 \\ \lambda_{12} v_2 + \dots + \lambda_{1n} v_n + \lambda_{11} v = 0 \end{cases}$$

A matriz de M' pode ser

$$G = \begin{bmatrix} F & \dots & 0 \\ -1 & 0 & \dots & 0 & \lambda \\ 0 & \lambda_{12} & \dots & \lambda_{1n} & \lambda_{11} \end{bmatrix}$$

Definimos $\theta : M \rightarrow M'$ com $\theta(u_i) = v_i$. θ é bem definida pois F faz parte de G . Afirimo que θ é injeção. De fato, indique-mos as linhas de F por $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_m$. Seja $m = \mu_1 u_1 + \dots + \mu_n u_n \in M$ com $\theta(m) = \mu_1 v_1 + \dots + \mu_n v_n = 0 \in M'$. Logo $(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n, 0) \in K'$, o módulo de relações de M' . Logo existem escalares $a_1, a_2, \dots, a_n, a, b \in \Lambda$ tais que

$$(E) (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n, 0) = a_1(\vec{r}_1, 0) + \dots + a_n(\vec{r}_n, 0) + \\ + a(-1, 0, \dots, 0, \lambda) + b(0, \lambda_{12}, \dots, \lambda_{1n}, \lambda_{11}).$$

Comparando-se a última entrada, $0 = a\lambda + b\lambda_{11}$

$$0 = a\lambda + b\lambda_{11}$$

donde $a\lambda = -b\lambda_{11}$. Como $(\lambda, \lambda_{11}) = 1$, $\lambda|b$ e $\lambda_{11}|a$ ou seja $-\frac{a}{\lambda_{11}} = \frac{b}{\lambda} = c \in \Lambda$. Substituindo em (E) para a e b, temos

$$(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n) = a_1\vec{r}_1 + \dots + a_n\vec{r}_n + c(\lambda_{11}, 0, \dots, 0) + \\ + c(0, \lambda\lambda_{12}, \dots, \lambda\lambda_{1n}) \\ = (a_1+c)\vec{r}_1 + a_2\vec{r}_2 + \dots + a_n\vec{r}_n.$$

Logo $(\mu_1, \dots, \mu_n) \in K$, o módulo de relações de F , portanto $m = \mu_1 u_1 + \dots + \mu_n u_n = 0$. Assim $\ker \theta = (0)$.

Mostremos que $\text{coker } \theta$ é finito. Ora, $\theta(M) = [v_1, \dots, v_n]$.

Logo $\frac{M'}{\theta(M)} = [\bar{v}]$. De (***) $\lambda M' \subseteq \theta(M)$ e $\lambda_{11} M' \subseteq \theta(M)$. Logo $\frac{M'}{\theta(M)}$ é anulado pelo ideal (λ, λ_{11}) de Λ . Assim $\frac{M'}{\theta(M)}$ é um

$\frac{\Lambda}{(\lambda, \lambda_{11})}$ -módulo. Como $\frac{\Lambda}{(\lambda, \lambda_{11})}$ é finito pelo Lema 1, pois λ e λ_{11} são primos entre si, decorre que $\frac{M'}{\theta(M)}$ que é gerado sobre

$\frac{\Lambda}{(\lambda, \lambda_{11})}$ por $\bar{v}$ é finito. Assim $\text{coker } \theta$ é finito. Olhamos agora para a matriz de relações de M' . Ora $M' = [v_1, \dots, v_n, v] = [v_2, \dots, v_n, v] = [v, v_2, \dots, v_n]$, pois $\lambda v = v_1$. Se usamos

$v_1 = \lambda v$, a primeira linha de G passa para

$$\lambda\lambda_{11}v + \lambda\lambda_{12}v_2 + \dots + \lambda\lambda_{1n}v_n = 0$$

o que decorre da 2ª relação de (***) ,

$$\lambda_{11}v + \lambda_{12}v_2 + \dots + \lambda_{1n}v_n = 0 .$$

Portanto M' é dado por

$$\begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \dots & \lambda_{1n} \\ \lambda\lambda_{21} & \lambda_{22} & & \lambda_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda\lambda_{m1} & \lambda_{m2} & & \lambda_{mn} \end{bmatrix}$$

LEMA 4: Se

$$F = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \lambda_{21} & & & & \\ \vdots & & B & & \vdots \\ \lambda_{m1} & & & & 0 \\ * & 0 & & 0 & p^{k_1} \end{bmatrix}$$

Se $B \neq 0$ e $B \sim B'$ então

$$F \sim \begin{bmatrix} \lambda_{11} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \lambda'_{21} & & & & \\ \vdots & & B' & & \\ \lambda'_{m1} & & & & \\ * & 0 & \dots & 0 & p^{k_1} \end{bmatrix}$$

desde que não se use operação do tipo III.

DEMONSTRAÇÃO: É suficiente considerar o caso onde B' é obtida de B via uma operação do tipo A, B, C ou I ou II, pois no caso geral o argumento se repete. Se B' é obtido de B via uma operação A ela não envolve a primeira linha e a primeira coluna de F e portanto $F \sim F'$ via mesmo tipo de operação efetuada sobre F e a primeira linha de F' permanece igual à de F . Se B' usa uma operação do tipo B, então a mesma operação efetuada sobre F leva a F' , sem afetar a primeira linha (os elementos nulos da primeira linha ajudam esta permanência). A mesma observação vale no caso do tipo C. Se B' usa uma operação do tipo I, digamos

$$B = \begin{bmatrix} \lambda_{22} & p\lambda_{23} & p\lambda_{24} & \dots & p\lambda_{2n} & 0 \\ \lambda_{32} & \lambda_{33} & \lambda_{34} & \dots & \lambda_{3n} & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_{m2} & \lambda_{m3} & \lambda_{m4} & \dots & \lambda_{mn} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & p^{k_1} \end{bmatrix}$$

onde $p \nmid \lambda_{22}$.

Se $B \sim B'$ onde

$$B' = \begin{bmatrix} \lambda_{22} & \lambda_{23} & \lambda_{24} & \dots & \lambda_{2n} & 0 \\ \lambda p_{32} & \lambda_{33} & \lambda_{34} & \dots & \lambda_{3n} & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ p\lambda_{m2} & \lambda_{m3} & \lambda_{m4} & \dots & \lambda_{mn} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & p^{k_1} \end{bmatrix}$$

Então $F \sim F'$ via a seguinte seqüência de operações:

$$F = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \lambda_{21} & & & & \\ \vdots & & B & & \\ \lambda_{m1} & \dots & & & \\ 0 & & & & p^{k_1} \end{bmatrix}$$

~
 via caso particular da Operação I, pois a primeira linha tem um único elemento não-nulo com $p^{\lambda_{11}}$.

$$\sim \begin{bmatrix} \lambda_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ p^{\lambda'_{21}} & & & & \\ \vdots & & B & & \\ p^{\lambda'_{m1}} & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & p^{k_1} \end{bmatrix}$$

~
 (via duas operações do tipo A troca 2a. e 1a. linhas e depois 2a. e 1a. colunas).

$$\sim \begin{bmatrix} \lambda_{22} & p^{\lambda'_{21}} & p^{\lambda_{23}} & p^{\lambda_{24}} & \dots & p^{\lambda_{2n}} & 0 \\ 0 & \lambda_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \lambda_{32} & p^{\lambda'_{31}} & \lambda_{33} & \lambda_{34} & \dots & \lambda_{3n} & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_{m2} & \lambda_{m1} & \lambda_{m3} & \lambda_{m4} & \dots & \lambda_{mn} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & p^{k_1} \end{bmatrix}$$

~
 via operação do tipo I.

$$\sim \begin{bmatrix} \lambda_{22} & \lambda'_{21} & \lambda_{23} & \dots & \lambda_{2n} & 0 \\ p \cdot 0 & \lambda_{11} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ p\lambda_{32} & p\lambda'_{31} & \lambda_{33} & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ p\lambda_{m2} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & p^{k_1} \end{bmatrix}$$

~
via duas operações do tipo A: troque as primeiras duas linhas e depois as primeiras colunas.

$$\sim \begin{bmatrix} \lambda_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \lambda'_{21} & \lambda_{22} & \lambda_{23} & \dots & \lambda_{2n} & 0 \\ p\lambda'_{31} & p\lambda_{32} & \lambda_{33} & \dots & \lambda_{3n} & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ p\lambda'_{m1} & p\lambda_{m2} & \lambda_{m3} & \dots & \lambda_{mn} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & p^{k_1} \end{bmatrix} = F'$$

Se B' é obtida de B via uma operação do tipo II, digamos

$$B = \begin{bmatrix} p^{k_\lambda}_{22} & p^{k_\lambda}_{23} & \dots & p^{k_\lambda}_{2n} & 0 \\ p^{k_\lambda}_{32} & & & & \\ \vdots & & \dots & & \\ p^{k_\lambda}_{m2} & & & & \\ 0 & & & & p^{k_1} \end{bmatrix} \sim$$

com $p^{\dagger\lambda}_{22}$.

$$B' = \begin{bmatrix} \lambda_{22} & \lambda_{23} & \dots & \lambda_{2n} & 0 \\ p^{k_\lambda}_{32} & \lambda_{33} & \dots & \lambda_{3n} & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ p^{k_\lambda}_{m2} & \lambda_{m3} & \dots & \lambda_{mn} & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & p^{k_1} \end{bmatrix}$$

então $F \sim F'$ via a seguinte sequência de transições.

$$F = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & 0 & \dots & 0 \\ \lambda_{21} & & & \\ \vdots & & B & \\ \lambda_{m1} & & & \\ 0 & & & p^{k_1} \end{bmatrix} \sim \text{via caso especial da Operação I}$$

$$\sim \begin{bmatrix} \lambda_{11} & 0 & \dots & 0 \\ p^{k_1} \lambda'_{21} & & & \\ \vdots & & B & \\ p^{k_1} \lambda'_{m1} & & & \\ 0 & & & p^{k_1} \end{bmatrix} \sim \text{via troca das duas las. linhas depois troca das duas las. colunas e depois Operação II}$$

$$\sim \begin{bmatrix} \lambda_{22} & \lambda'_{21} & \lambda_{23} & \dots & \lambda_{2n} & 0 \\ 0 & \lambda_{11} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ p^{k_1} \lambda_{32} & p^{k_1} \lambda'_{31} & \text{parte de B} & & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ p^{k_1} \lambda_{m2} & p^{k_1} \lambda'_{m1} & & & & \\ 0 & & & & & p^{k_1} \end{bmatrix} \sim \text{via troca de linhas e colunas}$$

$$\sim \begin{bmatrix} \lambda_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \lambda'_{21} & \lambda_{22} & \lambda_{23} & \dots & \lambda_{2n} & 0 \\ p^k \lambda'_{31} & p^k \lambda_{32} & \lambda_{33} & \dots & \lambda_{3n} & 0 \\ \vdots & \vdots & \text{parte de B} & & & \vdots \\ p^k \lambda'_{m1} & p^k \lambda_{m2} & & & & \\ 0 & 0 & & & & p^{k_1} \end{bmatrix} = F' .$$

O Lema 4 é rotineiro e deixou de tratar de operações do tipo III. O seguinte lema toma conta disto e é original e a chave de nossa simplificação da prova do Teorema 3 de Iwasawa.

LEMA 5: Seja

$$F = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & 0 & \dots & 0 \\ \lambda_{21} & & & \\ \vdots & & B & \\ \lambda_{m1} & & & \end{bmatrix}$$

onde λ_{11} é distinguido e seja $B \sim B'$ via uma operação do tipo III. Então

$$F \sim \begin{bmatrix} \lambda_{11} & 0 & \dots & 0 \\ \lambda'_{21} & & & \\ \vdots & & B' & \\ \lambda'_{m1} & & & \end{bmatrix}, \quad \lambda'_{i1} \in \Lambda.$$

DEMONSTRAÇÃO: Sem perda de generalidade pode-se supor que

$$B = \begin{bmatrix} p^k \lambda_{22} & p^k \lambda_{23} & \dots & p^k \lambda_{2n} \\ \lambda_{32} & \lambda_{33} & \dots & \lambda_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_{m2} & \lambda_{m3} & \dots & \lambda_{mn} \end{bmatrix}$$

onde existe λ tal que $p \nmid \lambda$ e $(\lambda \lambda_{22}, \lambda \lambda_{23}, \dots, \lambda \lambda_{2n})$ e também uma relação oriunda de B e que

$$B' = \begin{bmatrix} \lambda_{22} & \lambda_{23} & \dots & \lambda_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_{m2} & \lambda_{m3} & \dots & \lambda_{mn} \end{bmatrix}$$

uma vez que a transição de B para B' é via uma operação do tipo III. Ainda com o emprego do caso especial da Operação I, pode-

se supor que p^k divide λ_{i1} para $i = 2, 3, \dots, m$. Assim $\lambda_{21} = p^k \lambda'_{21}$.

Seja M um módulo tendo F como matriz de relações - digamos, $M = \lambda u_1 + \dots + \lambda u_n$. Seja $M' = \frac{M}{\lambda u_1}$, então $M' = \lambda \bar{u}_2 + \dots + \lambda \bar{u}_n$ e B é a matriz de relações de M' . Seja $x = \lambda'_{21} u_1 + \lambda'_{22} u_2 + \dots + \lambda'_{2n} u_n \in M$. Então $p^k \bar{x} = \bar{0}$ e $\lambda \bar{x} = \bar{0}$ em M' . Se θ é o homomorfismo canônico: $\theta: M \rightarrow M'$, então $\theta(\lambda x) = \bar{0}$. Daí $\lambda x \in \ker \theta = \lambda u_1$. Ora $\lambda_{11} u_1 = 0$ em M implica $\lambda \lambda_{11} x \in \lambda \lambda_{11} u_1 = (0)$. Portanto $(\lambda \lambda_{11} \lambda'_{21}, \lambda \lambda_{11} \lambda'_{22}, \dots, \lambda \lambda_{11} \lambda'_{2n})$ é uma relação definida por F . Como $p \nmid \lambda \lambda_{11}$ e como a segunda linha de F é $(p^k \lambda'_{21}, p^k \lambda'_{22}, \dots, p^k \lambda'_{2n})$, pode-se aplicar a Operação III a F para concluir $F \sim F'$.

Dado o Lema 5, podemos terminar a prova do Teorema 3 por um eficiente emprego de indução.

DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA 3 (Prosseguindo): Pode-se supor que

$$F = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & 0 & \dots & 0 \\ \lambda_{21} & & & \\ \vdots & & & \\ \lambda_{m1} & & & B \end{bmatrix}$$

é de tamanho $m \times n$ onde λ_{11} é distinguido e satisfaz a escolha já indicada. Note que se $F \sim F'$ o tamanho de F' não muda efe

tivamente, pois

$$F' = \begin{bmatrix} \text{matriz} & 0 \\ m \times n & \\ 0 & T \end{bmatrix}$$

onde T é uma matriz da forma

$$\begin{bmatrix} k_1 & & & 0 \\ p & & & \\ & k_2 & & \\ & p & & \\ & & \dots & \\ & & & k_t \\ 0 & & & p \end{bmatrix}$$

que surge com o emprego de operações do tipo II. Como T já está na forma diagonal desejada, trabalhamos somente com a matriz $m \times n$ que faz parte de F' . Empregamos indução sobre m . Se $m=1$ não há nada a fazer.

Consideramos a afirmativa: G de tamanho $m \times n$ é $\sim$ a G' com

Falta-nos apenas encher a primeira coluna com elementos nulos para λ'_{i1} , $i = 2, 3, \dots, m$. Ora, pode-se aplicar o algoritmo da divisão por λ_{11} a λ'_{i1} , $i = 2, 3, \dots, m$ e, via operações do tipo B, pode-se ainda supor que λ'_{i1} são polinômios de grau menor que o de λ_{11} . Aplicação da Operação I garante ainda que $p \mid \lambda'_{i1}$, $i = 2, 3, \dots, n$.

Afirmamos que $\lambda'_{i1} = 0$, $\forall i = 2, 3, \dots, r$. Caso contrário, digamos $\lambda'_{j1} \neq 0$, $2 \leq j \leq r$, existe ℓ tal que $p^\ell \mid \lambda'_{j1}$ e $p^{\ell+1} \nmid \lambda'_{j1}$. Ora $p \nmid \lambda_{jj}$ e p^ℓ divide $\lambda'_{ji} = 0$, $\forall i \neq 1$ e j . Assim, via operações dos tipos I e A aplicados ℓ vezes, concluímos que

$$F \sim F' = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & & & \\ \vdots & \dots & & \\ \mu_{j1} & & & \\ \vdots & & & \end{bmatrix}$$

donde $p^\ell \mu_{j1} = \lambda'_{j1}$ e $p \nmid \mu_{j1}$. Ora

$$\text{gr}_w \mu_{j1} \leq \text{gr } \mu_{j1} = \text{gr } \lambda'_{j1} < \text{gr } \lambda_{11},$$

contrariando a escolha de λ_{11} . Logo $\lambda'_{i1} = 0$ $\forall i = 2, 3, \dots, r$.

Assim

Agora, considerando a decomposição de cada λ_{ii} em fatores irre-
dutíveis e usando Lema 2 concluímos a demonstração do Teorema 3.

BIBLIOGRAFIA

- [1] ABHYANKAR, S.S.: *Local Analytic Geometry*. Academic Press, New York, 1964.
- [2] ARTIN, E.: *Algebraic Numbers and Algebraic Functions*. Gordon and Breach, 1967.
- [3] COHEN, I.: *On the Structure and Ideal Theory of Complete Local Rings*. Trans. Amer. Math. Soc., 1946.
- [4] ENDLER, O.: *Valuation Theory*. Springer-Verlag, Berlin, 1972.
- [5] LANG, S.: *Algebra*. Addison-Wesley Publishing Co., Massachusetts, 1965.
- [6] LANG, S.: *Cyclotomic Fields*. Springer-Verlag, New York, 1978.
- [7] MCCARTHY, P.J.: *Algebraic Extensions of Fields*. Blaisdell Publishing Co., Waltham, 1966.
- [8] MAL'CEV: *Foundations of Linear Algebra*. W.H. Freeman. San Francisco, 1963.
- [9] RIBENBOIM, P.: *L'Arithmétique des Corps*. Hermann, Paris, 1972.
- [10] RIBES, L.: *Introduction to Profinite Groups and Galois Cohomology*. Queen's Papers in Pure and Applied Mathematics, n° 24. Queen's University Kingston.